

表 3157 nPCR(g/kg/day) 透析前脈拍(拍/分)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前脈拍	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)			3 (21.4)	7 (50.0)	3 (21.4)	1 (7.1)					14 (100.0)		14	0.92	0.15
40～ (%)		12 (4.9)	72 (29.6)	103 (42.4)	52 (21.4)	3 (1.2)				1 (0.4)	243 (100.0)	9	252	0.88	0.20
50～ (%)	4 (0.2)	81 (3.7)	594 (27.2)	1,009 (46.2)	429 (19.7)	60 (2.7)	5 (0.2)				2,182 (100.0)	80	2,262	0.88	0.17
60～ (%)	13 (0.2)	214 (3.0)	1,899 (26.5)	3,299 (46.0)	1,454 (20.3)	260 (3.6)	33 (0.5)	6 (0.1)		1 (0.0)	7,179 (100.0)	234	7,413	0.89	0.17
70～ (%)	4 (0.0)	294 (3.3)	2,444 (27.2)	4,042 (45.0)	1,812 (20.2)	341 (3.8)	37 (0.4)	4 (0.0)	1 (0.0)		8,979 (100.0)	305	9,284	0.89	0.17
80～ (%)	7 (0.1)	211 (3.5)	1,670 (27.8)	2,734 (45.5)	1,159 (19.3)	206 (3.4)	20 (0.3)	2 (0.0)		2 (0.0)	6,011 (100.0)	193	6,204	0.88	0.17
90～ (%)	3 (0.1)	104 (3.8)	814 (29.8)	1,209 (44.2)	496 (18.1)	93 (3.4)	14 (0.5)				2,733 (100.0)	104	2,837	0.87	0.17
100～ (%)	2 (0.2)	48 (5.4)	277 (31.3)	383 (43.3)	143 (16.2)	29 (3.3)	2 (0.2)				884 (100.0)	41	925	0.86	0.17
110～ (%)	2 (0.9)	14 (6.2)	62 (27.6)	96 (42.7)	42 (18.7)	7 (3.1)	2 (0.9)				225 (100.0)	5	230	0.87	0.18
120～ (%)	1 (1.1)	3 (3.4)	32 (36.4)	33 (37.5)	17 (19.3)	2 (2.3)					88 (100.0)	2	90	0.86	0.18
合計 (%)	36 (0.1)	981 (3.4)	7,867 (27.6)	12,915 (45.3)	5,607 (19.6)	1,002 (3.5)	113 (0.4)	12 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.0)	28,538 (100.0)	973	29,511	0.88	0.17
記載なし (%)	7 (0.2)	149 (3.4)	1,206 (27.2)	1,965 (44.3)	924 (20.8)	165 (3.7)	15 (0.3)	1 (0.0)		2 (0.0)	4,434 (100.0)	1,026	5,460	0.89	0.17
総計 (%)	43 (0.1)	1,130 (3.4)	9,073 (27.5)	14,880 (45.1)	6,531 (19.8)	1,167 (3.5)	128 (0.4)	13 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.0)	32,972 (100.0)	1,999	34,971	0.88	0.17
平均	77.78	76.68	75.90	75.24	75.01	75.69	75.70	72.33	78.00	68.75	75.44	75.66	75.45		
標準偏差	18.19	13.86	13.10	12.78	12.68	12.20	12.49	7.64		18.57	12.88	13.28	12.89		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査