

表 3158 %クレアチニン産生速度(%) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	7,424	5,786	8,909	12,559	15,989	16,818	15,063	10,819	6,099	4,151	103,617	8,898	112,515	99.00	25.64
(%)	(7.2)	(5.6)	(8.6)	(12.1)	(15.4)	(16.2)	(14.5)	(10.4)	(5.9)	(4.0)	(100.0)				
女性	5,126	3,339	5,045	7,124	8,869	9,777	8,791	6,519	3,509	2,298	60,397	5,297	65,694	98.30	26.49
(%)	(8.5)	(5.5)	(8.4)	(11.8)	(14.7)	(16.2)	(14.6)	(10.8)	(5.8)	(3.8)	(100.0)				
合計	12,550	9,125	13,954	19,683	24,858	26,595	23,854	17,338	9,608	6,449	164,014	14,195	178,209	98.74	25.96
(%)	(7.7)	(5.6)	(8.5)	(12.0)	(15.2)	(16.2)	(14.5)	(10.6)	(5.9)	(3.9)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	12,550	9,125	13,954	19,683	24,858	26,595	23,854	17,338	9,608	6,449	164,014	14,195	178,209	98.74	25.96
(%)	(7.7)	(5.6)	(8.5)	(12.0)	(15.2)	(16.2)	(14.5)	(10.6)	(5.9)	(3.9)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査