

表 3164 %クレアチニン産生速度(%) 透析後体重(kg)別 (施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)								1 (33.3)		2 (66.7)	3 (100.0)	30	33	204.77	75.87
20～ (%)	8 (42.1)	5 (26.3)	2 (10.5)	3 (15.8)	1 (5.3)						19 (100.0)	8	27	62.27	19.12
30～ (%)	638 (32.5)	230 (11.7)	276 (14.1)	267 (13.6)	211 (10.7)	161 (8.2)	93 (4.7)	53 (2.7)	23 (1.2)	11 (0.6)	1,963 (100.0)	176	2,139	73.24	28.30
40～ (%)	2,505 (13.3)	1,628 (8.6)	2,191 (11.6)	2,646 (14.0)	2,990 (15.9)	2,666 (14.2)	1,969 (10.5)	1,250 (6.6)	624 (3.3)	370 (2.0)	18,839 (100.0)	1,266	20,105	89.81	26.60
50～ (%)	2,361 (6.1)	2,120 (5.5)	3,261 (8.4)	4,783 (12.4)	6,069 (15.7)	6,496 (16.8)	5,769 (14.9)	4,017 (10.4)	2,251 (5.8)	1,501 (3.9)	38,628 (100.0)	2,271	40,899	99.67	24.81
60～ (%)	1,217 (4.4)	1,098 (4.0)	1,945 (7.1)	2,942 (10.8)	4,150 (15.2)	4,593 (16.8)	4,417 (16.1)	3,449 (12.6)	2,040 (7.5)	1,513 (5.5)	27,364 (100.0)	1,408	28,772	103.76	24.34
70～ (%)	447 (4.1)	428 (3.9)	791 (7.3)	1,160 (10.7)	1,599 (14.7)	1,838 (16.9)	1,836 (16.9)	1,419 (13.0)	816 (7.5)	541 (5.0)	10,875 (100.0)	609	11,484	104.00	23.77
80～ (%)	149 (4.0)	159 (4.2)	287 (7.6)	449 (12.0)	582 (15.5)	661 (17.6)	647 (17.2)	419 (11.2)	237 (6.3)	163 (4.3)	3,753 (100.0)	197	3,950	102.44	23.44
90～ (%)	60 (4.3)	79 (5.7)	94 (6.8)	196 (14.1)	233 (16.8)	254 (18.3)	217 (15.6)	144 (10.4)	78 (5.6)	32 (2.3)	1,387 (100.0)	68	1,455	99.77	22.43
100～ (%)	18 (3.8)	21 (4.4)	37 (7.8)	68 (14.3)	91 (19.1)	99 (20.8)	71 (14.9)	38 (8.0)	23 (4.8)	10 (2.1)	476 (100.0)	30	506	99.15	20.93
110～ (%)	12 (6.5)	10 (5.4)	13 (7.1)	26 (14.1)	33 (17.9)	30 (16.3)	28 (15.2)	19 (10.3)	6 (3.3)	7 (3.8)	184 (100.0)	14	198	99.01	28.00
120～ (%)	9 (7.1)	8 (6.3)	12 (9.5)	19 (15.1)	30 (23.8)	20 (15.9)	16 (12.7)	10 (7.9)	1 (0.8)	1 (0.8)	126 (100.0)	3	129	92.90	21.90
合計 (%)	7,424 (7.2)	5,786 (5.6)	8,909 (8.6)	12,559 (12.1)	15,989 (15.4)	16,818 (16.2)	15,063 (14.5)	10,819 (10.4)	6,099 (5.9)	4,151 (4.0)	103,617 (100.0)	6,080	109,697	99.00	25.64
記載なし (%)												2,818	2,818		
総計 (%)	7,424 (7.2)	5,786 (5.6)	8,909 (8.6)	12,559 (12.1)	15,989 (15.4)	16,818 (16.2)	15,063 (14.5)	10,819 (10.4)	6,099 (5.9)	4,151 (4.0)	103,617 (100.0)	8,898	112,515	99.00	25.64
平均	53.88	56.47	57.59	58.76	59.61	60.36	61.15	61.50	61.81	61.84	59.51	58.13	59.43		
標準偏差	12.29	12.38	12.26	12.44	12.16	11.88	11.53	11.08	10.62	10.28	12.02	12.58	12.05		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査