

表 3168 %クレアチニン産生速度(%) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別(施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前補正 カルシウム濃度	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)	47 (8.4)	24 (4.3)	56 (10.1)	65 (11.7)	76 (13.6)	105 (18.9)	77 (13.8)	52 (9.3)	33 (5.9)	22 (3.9)	557 (100.0)	51	608	98.05	26.04
7.0～ (%)	39 (4.9)	44 (5.5)	72 (9.0)	101 (12.6)	123 (15.4)	125 (15.6)	124 (15.5)	97 (12.1)	40 (5.0)	34 (4.3)	799 (100.0)	43	842	100.60	23.80
7.5～ (%)	177 (5.6)	165 (5.2)	273 (8.6)	380 (12.0)	495 (15.6)	508 (16.0)	492 (15.5)	361 (11.4)	194 (6.1)	126 (4.0)	3,171 (100.0)	174	3,345	100.60	24.45
8.0～ (%)	617 (5.9)	596 (5.7)	901 (8.6)	1,303 (12.4)	1,629 (15.6)	1,773 (16.9)	1,487 (14.2)	1,102 (10.5)	646 (6.2)	416 (4.0)	10,470 (100.0)	552	11,022	99.64	25.04
8.4～ (%)	184 (6.1)	162 (5.4)	248 (8.2)	397 (13.2)	497 (16.5)	531 (17.6)	384 (12.7)	323 (10.7)	163 (5.4)	129 (4.3)	3,018 (100.0)	153	3,171	99.39	24.69
8.5～ (%)	2,559 (6.9)	2,056 (5.6)	3,331 (9.0)	4,570 (12.4)	5,798 (15.7)	6,018 (16.3)	5,314 (14.4)	3,756 (10.2)	2,083 (5.6)	1,411 (3.8)	36,896 (100.0)	1,967	38,863	98.75	25.36
9.0～ (%)	3,488 (7.2)	2,722 (5.6)	4,077 (8.4)	5,838 (12.0)	7,441 (15.3)	7,866 (16.2)	7,194 (14.8)	5,253 (10.8)	2,871 (5.9)	1,904 (3.9)	48,654 (100.0)	2,681	51,335	99.12	25.70
9.5～ (%)	2,535 (7.5)	1,693 (5.0)	2,757 (8.1)	3,934 (11.6)	5,014 (14.8)	5,488 (16.2)	5,047 (14.9)	3,867 (11.4)	2,099 (6.2)	1,426 (4.2)	33,860 (100.0)	2,032	35,892	99.71	26.06
10.0～ (%)	361 (8.4)	238 (5.6)	358 (8.4)	466 (10.9)	608 (14.2)	714 (16.7)	674 (15.7)	444 (10.4)	241 (5.6)	176 (4.1)	4,280 (100.0)	256	4,536	98.77	26.29
10.1～ (%)	1,049 (9.6)	653 (6.0)	888 (8.1)	1,270 (11.6)	1,546 (14.1)	1,801 (16.4)	1,614 (14.7)	1,075 (9.8)	642 (5.9)	431 (3.9)	10,969 (100.0)	712	11,681	97.52	27.01
10.5～ (%)	666 (12.5)	345 (6.5)	457 (8.6)	605 (11.4)	754 (14.2)	765 (14.4)	696 (13.1)	507 (9.5)	316 (6.0)	198 (3.7)	5,309 (100.0)	403	5,712	95.07	28.71
11.0～ (%)	332 (19.1)	119 (6.8)	169 (9.7)	187 (10.7)	243 (13.9)	239 (13.7)	203 (11.7)	125 (7.2)	72 (4.1)	53 (3.0)	1,742 (100.0)	149	1,891	89.36	30.37
11.5～ (%)	125 (20.3)	51 (8.3)	55 (8.9)	93 (15.1)	72 (11.7)	70 (11.4)	66 (10.7)	44 (7.2)	23 (3.7)	16 (2.6)	615 (100.0)	63	678	86.63	30.19
12.0～ (%)	135 (33.8)	52 (13.0)	42 (10.5)	36 (9.0)	36 (9.0)	41 (10.3)	31 (7.8)	20 (5.0)	4 (1.0)	3 (0.8)	400 (100.0)	46	446	74.88	30.38
合計 (%)	12,314 (7.7)	8,920 (5.5)	13,684 (8.5)	19,245 (12.0)	24,332 (15.1)	26,044 (16.2)	23,403 (14.6)	17,026 (10.6)	9,427 (5.9)	6,345 (3.9)	160,740 (100.0)	9,282	170,022	98.76	25.98
記載なし (%)	236 (7.2)	205 (6.3)	270 (8.2)	438 (13.4)	526 (16.1)	551 (16.8)	451 (13.8)	312 (9.5)	181 (5.5)	104 (3.2)	3,274 (100.0)	4,913	8,187	97.67	24.94
総計 (%)	12,550 (7.7)	9,125 (5.6)	13,954 (8.5)	19,683 (12.0)	24,858 (15.2)	26,595 (16.2)	23,854 (14.5)	17,338 (10.6)	9,608 (5.9)	6,449 (3.9)	164,014 (100.0)	14,195	178,209	98.74	25.96
平均	9.41	9.27	9.23	9.22	9.21	9.22	9.23	9.22	9.23	9.23	9.24	9.31	9.24		
標準偏差	0.86	0.78	0.75	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.74	0.80	0.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査