

表 3179 %クレアチニン産生速度(%) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

| 性別   | 60未満  | 60～   | 70～   | 80～    | 90～    | 100～   | 110～   | 120～   | 130～  | 140～  | 合計      | 記載なし  | 総計     | 平均     | 標準偏差  |
|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 男性   | 1,002 | 886   | 1,571 | 2,529  | 3,208  | 3,592  | 3,352  | 2,321  | 1,263 | 840   | 20,564  | 1,212 | 21,776 | 101.69 | 23.86 |
| (%)  | (4.9) | (4.3) | (7.6) | (12.3) | (15.6) | (17.5) | (16.3) | (11.3) | (6.1) | (4.1) | (100.0) |       |        |        |       |
| 女性   | 632   | 518   | 907   | 1,339  | 1,892  | 2,242  | 2,047  | 1,522  | 829   | 468   | 12,396  | 799   | 13,195 | 102.31 | 23.89 |
| (%)  | (5.1) | (4.2) | (7.3) | (10.8) | (15.3) | (18.1) | (16.5) | (12.3) | (6.7) | (3.8) | (100.0) |       |        |        |       |
| 合計   | 1,634 | 1,404 | 2,478 | 3,868  | 5,100  | 5,834  | 5,399  | 3,843  | 2,092 | 1,308 | 32,960  | 2,011 | 34,971 | 101.92 | 23.87 |
| (%)  | (5.0) | (4.3) | (7.5) | (11.7) | (15.5) | (17.7) | (16.4) | (11.7) | (6.3) | (4.0) | (100.0) |       |        |        |       |
| 記載なし |       |       |       |        |        |        |        |        |       |       |         |       |        |        |       |
| (%)  |       |       |       |        |        |        |        |        |       |       |         |       |        |        |       |
| 総計   | 1,634 | 1,404 | 2,478 | 3,868  | 5,100  | 5,834  | 5,399  | 3,843  | 2,092 | 1,308 | 32,960  | 2,011 | 34,971 | 101.92 | 23.87 |
| (%)  | (5.0) | (4.3) | (7.5) | (11.7) | (15.5) | (17.7) | (16.4) | (11.7) | (6.3) | (4.0) | (100.0) |       |        |        |       |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査