

表 3183 %クレアチニン産生速度(%) 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

医療機関	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	9	2	2	3	4	3	4	2		1	30	7	37	82.66	30.97
(%)	(30.0)	(6.7)	(6.7)	(10.0)	(13.3)	(10.0)	(13.3)	(6.7)		(3.3)	(100.0)				
私立大学	7	5	13	18	26	22	22	14	7	3	137	14	151	99.65	22.18
(%)	(5.1)	(3.6)	(9.5)	(13.1)	(19.0)	(16.1)	(16.1)	(10.2)	(5.1)	(2.2)	(100.0)				
国立	8	4	4	4	1	2	4	2		2	31	1	32	81.51	36.75
(%)	(25.8)	(12.9)	(12.9)	(12.9)	(3.2)	(6.5)	(12.9)	(6.5)		(6.5)	(100.0)				
県市町村立	66	79	118	169	233	254	226	172	96	58	1,471	68	1,539	101.73	24.42
(%)	(4.5)	(5.4)	(8.0)	(11.5)	(15.8)	(17.3)	(15.4)	(11.7)	(6.5)	(3.9)	(100.0)				
社会保険	12	11	19	26	28	51	47	46	24	10	274	17	291	105.41	23.09
(%)	(4.4)	(4.0)	(6.9)	(9.5)	(10.2)	(18.6)	(17.2)	(16.8)	(8.8)	(3.6)	(100.0)				
厚生連	41	36	62	98	161	131	118	107	59	44	857	48	905	102.23	24.22
(%)	(4.8)	(4.2)	(7.2)	(11.4)	(18.8)	(15.3)	(13.8)	(12.5)	(6.9)	(5.1)	(100.0)				
その他公的	22	35	60	77	91	97	83	73	28	12	578	40	618	99.54	22.84
(%)	(3.8)	(6.1)	(10.4)	(13.3)	(15.7)	(16.8)	(14.4)	(12.6)	(4.8)	(2.1)	(100.0)				
私立総合	75	48	69	122	120	141	146	85	64	30	900	55	955	98.82	26.31
(%)	(8.3)	(5.3)	(7.7)	(13.6)	(13.3)	(15.7)	(16.2)	(9.4)	(7.1)	(3.3)	(100.0)				
私立	549	383	669	965	1,208	1,383	1,318	901	484	333	8,193	633	8,826	100.36	25.20
(%)	(6.7)	(4.7)	(8.2)	(11.8)	(14.7)	(16.9)	(16.1)	(11.0)	(5.9)	(4.1)	(100.0)				
私立診療所	845	801	1,462	2,386	3,228	3,750	3,431	2,441	1,330	815	20,489	1,128	21,617	102.78	23.09
(%)	(4.1)	(3.9)	(7.1)	(11.6)	(15.8)	(18.3)	(16.7)	(11.9)	(6.5)	(4.0)	(100.0)				
総計	1,634	1,404	2,478	3,868	5,100	5,834	5,399	3,843	2,092	1,308	32,960	2,011	34,971	101.92	23.87
(%)	(5.0)	(4.3)	(7.5)	(11.7)	(15.5)	(17.7)	(16.4)	(11.7)	(6.3)	(4.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査