

表 3184 %クレアチニン産生速度(%) 透析後体重(kg)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)												11	11		
20～ (%)	17 (32.7)	10 (19.2)	6 (11.5)	7 (13.5)	6 (11.5)	4 (7.7)		1 (1.9)		1 (1.9)	52 (100.0)	15	67	72.47	25.12
30～ (%)	281 (12.3)	171 (7.5)	250 (10.9)	317 (13.9)	341 (14.9)	360 (15.8)	266 (11.6)	166 (7.3)	93 (4.1)	40 (1.8)	2,285 (100.0)	111	2,396	91.79	26.83
40～ (%)	523 (6.1)	417 (4.8)	722 (8.4)	1,082 (12.6)	1,351 (15.7)	1,528 (17.8)	1,337 (15.5)	953 (11.1)	453 (5.3)	236 (2.7)	8,602 (100.0)	351	8,953	99.44	23.74
50～ (%)	454 (4.3)	438 (4.1)	776 (7.3)	1,261 (11.9)	1,681 (15.8)	1,905 (17.9)	1,766 (16.6)	1,239 (11.7)	689 (6.5)	418 (3.9)	10,627 (100.0)	381	11,008	102.44	23.20
60～ (%)	225 (3.2)	218 (3.1)	408 (5.8)	742 (10.6)	1,051 (15.0)	1,239 (17.7)	1,263 (18.1)	939 (13.4)	522 (7.5)	378 (5.4)	6,985 (100.0)	246	7,231	105.74	23.16
70～ (%)	79 (2.8)	90 (3.2)	179 (6.3)	277 (9.8)	429 (15.2)	490 (17.4)	507 (18.0)	383 (13.6)	229 (8.1)	160 (5.7)	2,823 (100.0)	87	2,910	106.28	22.95
80～ (%)	34 (3.3)	40 (3.8)	80 (7.7)	118 (11.3)	165 (15.8)	194 (18.6)	175 (16.8)	108 (10.4)	70 (6.7)	58 (5.6)	1,042 (100.0)	31	1,073	103.62	23.07
90～ (%)	16 (4.4)	13 (3.6)	43 (11.8)	40 (11.0)	47 (12.9)	71 (19.6)	52 (14.3)	42 (11.6)	25 (6.9)	14 (3.9)	363 (100.0)	8	371	101.75	22.96
100～ (%)	4 (3.8)	3 (2.9)	7 (6.7)	14 (13.3)	19 (18.1)	23 (21.9)	18 (17.1)	9 (8.6)	6 (5.7)	2 (1.9)	105 (100.0)	4	109	101.56	21.45
110～ (%)	1 (2.2)	2 (4.4)	3 (6.7)	5 (11.1)	5 (11.1)	13 (28.9)	10 (22.2)	2 (4.4)	4 (8.9)		45 (100.0)	1	46	103.05	18.44
120～ (%)		2 (6.5)	4 (12.9)	5 (16.1)	5 (16.1)	7 (22.6)	5 (16.1)	1 (3.2)	1 (3.2)	1 (3.2)	31 (100.0)		31	98.05	19.44
合計 (%)	1,634 (5.0)	1,404 (4.3)	2,478 (7.5)	3,868 (11.7)	5,100 (15.5)	5,834 (17.7)	5,399 (16.4)	3,843 (11.7)	2,092 (6.3)	1,308 (4.0)	32,960 (100.0)	1,246	34,206	101.92	23.87
記載なし (%)												765	765		
総計 (%)	1,634 (5.0)	1,404 (4.3)	2,478 (7.5)	3,868 (11.7)	5,100 (15.5)	5,834 (17.7)	5,399 (16.4)	3,843 (11.7)	2,092 (6.3)	1,308 (4.0)	32,960 (100.0)	2,011	34,971	101.92	23.87
平均	51.49	53.82	55.07	55.56	56.28	56.75	57.41	57.48	58.35	59.72	56.44	54.05	56.35		
標準偏差	12.96	13.19	13.86	12.92	12.73	12.95	12.55	12.02	12.42	12.03	12.86	13.31	12.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査