

表 3185 %クレアチニン産生速度(%) 透析後体重(kg)別 (血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)												8	8		
20～ (%)	1 (25.0)	2 (50.0)			1 (25.0)						4 (100.0)	2	6	66.47	21.86
30～ (%)	58 (23.8)	27 (11.1)	38 (15.6)	42 (17.2)	20 (8.2)	30 (12.3)	16 (6.6)	6 (2.5)	2 (0.8)	5 (2.0)	244 (100.0)	10	254	79.98	31.55
40～ (%)	292 (9.7)	210 (7.0)	322 (10.7)	492 (16.4)	514 (17.1)	465 (15.5)	351 (11.7)	233 (7.8)	80 (2.7)	43 (1.4)	3,002 (100.0)	131	3,133	92.38	23.97
50～ (%)	347 (4.7)	336 (4.5)	581 (7.8)	953 (12.8)	1,187 (16.0)	1,324 (17.8)	1,212 (16.3)	804 (10.8)	422 (5.7)	266 (3.6)	7,432 (100.0)	251	7,683	101.06	23.21
60～ (%)	189 (3.2)	177 (3.0)	342 (5.8)	642 (10.8)	898 (15.1)	1,054 (17.8)	1,086 (18.3)	784 (13.2)	445 (7.5)	317 (5.3)	5,934 (100.0)	203	6,137	105.68	22.95
70～ (%)	65 (2.6)	81 (3.2)	160 (6.4)	238 (9.5)	376 (15.0)	432 (17.2)	458 (18.2)	348 (13.9)	212 (8.4)	141 (5.6)	2,511 (100.0)	81	2,592	106.63	22.92
80～ (%)	31 (3.4)	34 (3.7)	72 (7.8)	100 (10.9)	143 (15.5)	177 (19.2)	152 (16.5)	93 (10.1)	68 (7.4)	51 (5.5)	921 (100.0)	26	947	103.84	23.22
90～ (%)	14 (4.1)	12 (3.5)	42 (12.3)	39 (11.4)	43 (12.6)	67 (19.6)	46 (13.5)	41 (12.0)	24 (7.0)	14 (4.1)	342 (100.0)	8	350	101.88	23.10
100～ (%)	4 (3.9)	3 (2.9)	7 (6.9)	13 (12.7)	17 (16.7)	23 (22.5)	18 (17.6)	9 (8.8)	6 (5.9)	2 (2.0)	102 (100.0)	4	106	101.83	21.71
110～ (%)	1 (2.4)	2 (4.9)	3 (7.3)	5 (12.2)	4 (9.8)	13 (31.7)	8 (19.5)	2 (4.9)	3 (7.3)		41 (100.0)	1	42	101.96	18.51
120～ (%)		2 (6.5)	4 (12.9)	5 (16.1)	5 (16.1)	7 (22.6)	5 (16.1)	1 (3.2)	1 (3.2)	1 (3.2)	31 (100.0)		31	98.05	19.44
合計 (%)	1,002 (4.9)	886 (4.3)	1,571 (7.6)	2,529 (12.3)	3,208 (15.6)	3,592 (17.5)	3,352 (16.3)	2,321 (11.3)	1,263 (6.1)	840 (4.1)	20,564 (100.0)	725	21,289	101.69	23.86
記載なし (%)												487	487		
総計 (%)	1,002 (4.9)	886 (4.3)	1,571 (7.6)	2,529 (12.3)	3,208 (15.6)	3,592 (17.5)	3,352 (16.3)	2,321 (11.3)	1,263 (6.1)	840 (4.1)	20,564 (100.0)	1,212	21,776	101.69	23.86
平均	55.83	58.03	59.74	59.47	60.67	61.69	62.22	62.48	63.93	64.09	61.08	59.02	61.01		
標準偏差	12.40	12.70	13.60	12.43	11.91	12.37	11.52	11.01	11.16	10.79	12.15	12.96	12.19		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査