

表 3186 %クレアチニン産生速度(%) 透析後体重(kg)別 (血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)												3	3		
20～ (%)	16 (33.3)	8 (16.7)	6 (12.5)	7 (14.6)	5 (10.4)	4 (8.3)		1 (2.1)		1 (2.1)	48 (100.0)	13	61	72.97	25.52
30～ (%)	223 (10.9)	144 (7.1)	212 (10.4)	275 (13.5)	321 (15.7)	330 (16.2)	250 (12.2)	160 (7.8)	91 (4.5)	35 (1.7)	2,041 (100.0)	101	2,142	93.20	25.86
40～ (%)	231 (4.1)	207 (3.7)	400 (7.1)	590 (10.5)	837 (14.9)	1,063 (19.0)	986 (17.6)	720 (12.9)	373 (6.7)	193 (3.4)	5,600 (100.0)	220	5,820	103.22	22.74
50～ (%)	107 (3.3)	102 (3.2)	195 (6.1)	308 (9.6)	494 (15.5)	581 (18.2)	554 (17.3)	435 (13.6)	267 (8.4)	152 (4.8)	3,195 (100.0)	130	3,325	105.66	22.83
60～ (%)	36 (3.4)	41 (3.9)	66 (6.3)	100 (9.5)	153 (14.6)	185 (17.6)	177 (16.8)	155 (14.7)	77 (7.3)	61 (5.8)	1,051 (100.0)	43	1,094	106.06	24.31
70～ (%)	14 (4.5)	9 (2.9)	19 (6.1)	39 (12.5)	53 (17.0)	58 (18.6)	49 (15.7)	35 (11.2)	17 (5.4)	19 (6.1)	312 (100.0)	6	318	103.48	23.06
80～ (%)	3 (2.5)	6 (5.0)	8 (6.6)	18 (14.9)	22 (18.2)	17 (14.0)	23 (19.0)	15 (12.4)	2 (1.7)	7 (5.8)	121 (100.0)	5	126	101.96	21.84
90～ (%)	2 (9.5)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	4 (19.0)	4 (19.0)	6 (28.6)	1 (4.8)	1 (4.8)		21 (100.0)		21	99.56	21.03
100～ (%)				1 (33.3)	2 (66.7)						3 (100.0)		3	92.47	3.13
110～ (%)					1 (25.0)		2 (50.0)		1 (25.0)		4 (100.0)		4	114.28	15.27
120～ (%)															
合計 (%)	632 (5.1)	518 (4.2)	907 (7.3)	1,339 (10.8)	1,892 (15.3)	2,242 (18.1)	2,047 (16.5)	1,522 (12.3)	829 (6.7)	468 (3.8)	12,396 (100.0)	521	12,917	102.31	23.89
記載なし (%)												278	278		
総計 (%)	632 (5.1)	518 (4.2)	907 (7.3)	1,339 (10.8)	1,892 (15.3)	2,242 (18.1)	2,047 (16.5)	1,522 (12.3)	829 (6.7)	468 (3.8)	12,396 (100.0)	799	13,195	102.31	23.89
平均	44.63	46.64	46.97	48.18	48.82	48.85	49.52	49.87	49.84	51.88	48.74	47.14	48.68		
標準偏差	10.66	10.67	10.04	10.36	10.38	9.48	9.91	9.18	8.92	10.00	9.99	10.38	10.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査