

表 3187 %クレアチニン産生速度(%) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前アルブミン 濃度	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)	3 (37.5)	1 (12.5)		1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)				8 (100.0)	2	10	69.10	34.46
1.5～ (%)	26 (65.0)	4 (10.0)	6 (15.0)	1 (2.5)		1 (2.5)	1 (2.5)	1 (2.5)			40 (100.0)	3	43	52.76	25.04
2.0～ (%)	109 (48.7)	40 (17.9)	29 (12.9)	24 (10.7)	12 (5.4)	8 (3.6)		1 (0.4)		1 (0.4)	224 (100.0)	15	239	60.21	23.10
2.5～ (%)	259 (23.2)	148 (13.2)	157 (14.0)	164 (14.7)	129 (11.5)	118 (10.6)	82 (7.3)	21 (1.9)	19 (1.7)	21 (1.9)	1,118 (100.0)	74	1,192	80.00	27.30
3.0～ (%)	523 (7.1)	422 (5.7)	691 (9.4)	1,043 (14.1)	1,219 (16.5)	1,148 (15.6)	1,028 (13.9)	711 (9.6)	364 (4.9)	225 (3.1)	7,374 (100.0)	340	7,714	97.58	24.61
3.5～ (%)	536 (3.1)	614 (3.5)	1,199 (6.9)	1,956 (11.2)	2,688 (15.4)	3,235 (18.5)	3,029 (17.3)	2,205 (12.6)	1,216 (7.0)	786 (4.5)	17,464 (100.0)	617	18,081	104.37	22.50
4.0～ (%)	147 (2.4)	144 (2.4)	355 (5.8)	618 (10.2)	942 (15.5)	1,177 (19.4)	1,137 (18.7)	839 (13.8)	460 (7.6)	259 (4.3)	6,078 (100.0)	205	6,283	106.17	21.39
4.5～ (%)	11 (4.1)	13 (4.9)	15 (5.6)	21 (7.9)	33 (12.4)	60 (22.6)	58 (21.8)	29 (10.9)	18 (6.8)	8 (3.0)	266 (100.0)	9	275	103.51	22.81
5.0～ (%)			1 (7.7)	1 (7.7)	2 (15.4)	3 (23.1)	3 (23.1)	3 (23.1)			13 (100.0)	2	15	107.89	16.14
合計 (%)	1,614 (5.0)	1,386 (4.3)	2,453 (7.5)	3,829 (11.8)	5,026 (15.4)	5,751 (17.6)	5,339 (16.4)	3,810 (11.7)	2,077 (6.4)	1,300 (4.0)	32,585 (100.0)	1,267	33,852	101.95	23.89
記載なし (%)	20 (5.3)	18 (4.8)	25 (6.7)	39 (10.4)	74 (19.7)	83 (22.1)	60 (16.0)	33 (8.8)	15 (4.0)	8 (2.1)	375 (100.0)	744	1,119	99.51	22.23
総計 (%)	1,634 (5.0)	1,404 (4.3)	2,478 (7.5)	3,868 (11.7)	5,100 (15.5)	5,834 (17.7)	5,399 (16.4)	3,843 (11.7)	2,092 (6.3)	1,308 (4.0)	32,960 (100.0)	2,011	34,971	101.92	23.87
平均	3.30	3.46	3.55	3.60	3.65	3.69	3.71	3.72	3.72	3.70	3.64	3.57	3.64		
標準偏差	0.56	0.46	0.42	0.38	0.35	0.35	0.34	0.31	0.31	0.31	0.38	0.43	0.38		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査