

表 3189 %クレアチニン産生速度(%) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前補正 カルシウム濃度	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)	5 (3.8)	9 (6.9)	7 (5.4)	19 (14.6)	18 (13.8)	23 (17.7)	26 (20.0)	11 (8.5)	7 (5.4)	5 (3.8)	130 (100.0)	5	135	100.97	22.22
7.0～ (%)	8 (3.7)	13 (6.0)	13 (6.0)	20 (9.3)	43 (20.0)	36 (16.7)	37 (17.2)	19 (8.8)	12 (5.6)	14 (6.5)	215 (100.0)	7	222	103.37	23.64
7.5～ (%)	18 (2.4)	27 (3.7)	57 (7.7)	99 (13.5)	101 (13.7)	136 (18.5)	112 (15.2)	85 (11.5)	53 (7.2)	48 (6.5)	736 (100.0)	39	775	104.73	23.19
8.0～ (%)	81 (3.6)	92 (4.1)	185 (8.2)	230 (10.1)	387 (17.1)	420 (18.5)	379 (16.7)	266 (11.7)	134 (5.9)	94 (4.1)	2,268 (100.0)	85	2,353	102.88	22.68
8.4～ (%)	35 (5.4)	24 (3.7)	50 (7.7)	76 (11.7)	93 (14.3)	109 (16.7)	121 (18.6)	90 (13.8)	34 (5.2)	19 (2.9)	651 (100.0)	28	679	101.87	22.81
8.5～ (%)	379 (5.1)	318 (4.3)	555 (7.4)	832 (11.2)	1,166 (15.6)	1,248 (16.7)	1,258 (16.9)	918 (12.3)	492 (6.6)	288 (3.9)	7,454 (100.0)	299	7,753	102.17	23.79
9.0～ (%)	441 (4.5)	403 (4.1)	745 (7.6)	1,203 (12.3)	1,516 (15.5)	1,758 (17.9)	1,591 (16.2)	1,114 (11.4)	650 (6.6)	381 (3.9)	9,802 (100.0)	354	10,156	102.11	23.60
9.5～ (%)	315 (4.7)	267 (4.0)	504 (7.5)	782 (11.6)	1,012 (15.0)	1,212 (17.9)	1,116 (16.5)	807 (11.9)	456 (6.7)	285 (4.2)	6,756 (100.0)	222	6,978	102.64	23.86
10.0～ (%)	46 (5.8)	32 (4.0)	58 (7.3)	91 (11.4)	120 (15.0)	127 (15.9)	134 (16.8)	100 (12.5)	52 (6.5)	39 (4.9)	799 (100.0)	38	837	102.40	24.71
10.1～ (%)	142 (6.5)	102 (4.7)	144 (6.6)	269 (12.3)	338 (15.5)	405 (18.5)	325 (14.9)	256 (11.7)	122 (5.6)	81 (3.7)	2,184 (100.0)	100	2,284	100.43	24.63
10.5～ (%)	79 (7.4)	63 (5.9)	91 (8.6)	128 (12.1)	153 (14.4)	191 (18.0)	172 (16.2)	105 (9.9)	46 (4.3)	34 (3.2)	1,062 (100.0)	41	1,103	98.15	25.57
11.0～ (%)	31 (9.0)	25 (7.3)	30 (8.7)	49 (14.2)	54 (15.7)	59 (17.2)	47 (13.7)	25 (7.3)	16 (4.7)	8 (2.3)	344 (100.0)	13	357	94.75	25.94
11.5～ (%)	22 (20.8)	6 (5.7)	7 (6.6)	16 (15.1)	14 (13.2)	11 (10.4)	17 (16.0)	7 (6.6)	3 (2.8)	3 (2.8)	106 (100.0)	6	112	87.36	32.24
12.0～ (%)	12 (19.0)	5 (7.9)	6 (9.5)	12 (19.0)	9 (14.3)	12 (19.0)	2 (3.2)	4 (6.3)		1 (1.6)	63 (100.0)	2	65	82.52	27.29
合計 (%)	1,614 (5.0)	1,386 (4.3)	2,452 (7.5)	3,826 (11.7)	5,024 (15.4)	5,747 (17.6)	5,337 (16.4)	3,807 (11.7)	2,077 (6.4)	1,300 (4.0)	32,570 (100.0)	1,239	33,809	101.95	23.90
記載なし (%)	20 (5.1)	18 (4.6)	26 (6.7)	42 (10.8)	76 (19.5)	87 (22.3)	62 (15.9)	36 (9.2)	15 (3.8)	8 (2.1)	390 (100.0)	772	1,162	99.64	22.01
総計 (%)	1,634 (5.0)	1,404 (4.3)	2,478 (7.5)	3,868 (11.7)	5,100 (15.5)	5,834 (17.7)	5,399 (16.4)	3,843 (11.7)	2,092 (6.3)	1,308 (4.0)	32,960 (100.0)	2,011	34,971	101.92	23.87
平均	9.37	9.25	9.22	9.24	9.20	9.22	9.20	9.20	9.19	9.17	9.22	9.21	9.22		
標準偏差	0.85	0.81	0.77	0.77	0.74	0.74	0.72	0.70	0.69	0.74	0.74	0.78	0.75		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査