

表 3195 %クレアチニン産生速度(%) HDL-C濃度(mg/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

HDL-C濃度	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満	18	3	4	5	6	10	7	7	2	2	64	4	68	87.34	34.80
(%)	(28.1)	(4.7)	(6.3)	(7.8)	(9.4)	(15.6)	(10.9)	(10.9)	(3.1)	(3.1)	(100.0)				
20～	112	78	126	180	261	238	229	172	94	65	1,555	46	1,601	99.83	26.17
(%)	(7.2)	(5.0)	(8.1)	(11.6)	(16.8)	(15.3)	(14.7)	(11.1)	(6.0)	(4.2)	(100.0)				
30～	288	236	403	616	737	859	771	580	335	242	5,067	169	5,236	101.53	25.03
(%)	(5.7)	(4.7)	(8.0)	(12.2)	(14.5)	(17.0)	(15.2)	(11.4)	(6.6)	(4.8)	(100.0)				
40～	332	272	494	716	971	1,083	1,006	705	414	247	6,240	181	6,421	101.56	23.97
(%)	(5.3)	(4.4)	(7.9)	(11.5)	(15.6)	(17.4)	(16.1)	(11.3)	(6.6)	(4.0)	(100.0)				
50～	212	192	369	617	801	939	903	585	319	185	5,122	135	5,257	102.58	22.71
(%)	(4.1)	(3.7)	(7.2)	(12.0)	(15.6)	(18.3)	(17.6)	(11.4)	(6.2)	(3.6)	(100.0)				
60～	118	125	214	403	551	588	606	438	199	114	3,356	102	3,458	103.21	22.06
(%)	(3.5)	(3.7)	(6.4)	(12.0)	(16.4)	(17.5)	(18.1)	(13.1)	(5.9)	(3.4)	(100.0)				
70～	48	59	114	201	285	317	346	224	125	69	1,788	43	1,831	104.65	21.76
(%)	(2.7)	(3.3)	(6.4)	(11.2)	(15.9)	(17.7)	(19.4)	(12.5)	(7.0)	(3.9)	(100.0)				
80～	27	21	58	97	141	179	177	120	54	32	906	22	928	104.41	21.32
(%)	(3.0)	(2.3)	(6.4)	(10.7)	(15.6)	(19.8)	(19.5)	(13.2)	(6.0)	(3.5)	(100.0)				
90～	10	12	24	42	59	84	67	47	31	14	390	5	395	104.78	21.19
(%)	(2.6)	(3.1)	(6.2)	(10.8)	(15.1)	(21.5)	(17.2)	(12.1)	(7.9)	(3.6)	(100.0)				
100～	11	15	17	40	50	76	48	47	14	16	334	10	344	103.51	22.64
(%)	(3.3)	(4.5)	(5.1)	(12.0)	(15.0)	(22.8)	(14.4)	(14.1)	(4.2)	(4.8)	(100.0)				
合計	1,176	1,013	1,823	2,917	3,862	4,373	4,160	2,925	1,587	986	24,822	717	25,539	102.24	23.60
(%)	(4.7)	(4.1)	(7.3)	(11.8)	(15.6)	(17.6)	(16.8)	(11.8)	(6.4)	(4.0)	(100.0)				
記載なし	458	391	655	951	1,238	1,461	1,239	918	505	322	8,138	1,294	9,432	100.94	24.66
(%)	(5.6)	(4.8)	(8.0)	(11.7)	(15.2)	(18.0)	(15.2)	(11.3)	(6.2)	(4.0)	(100.0)				
総計	1,634	1,404	2,478	3,868	5,100	5,834	5,399	3,843	2,092	1,308	32,960	2,011	34,971	101.92	23.87
(%)	(5.0)	(4.3)	(7.5)	(11.7)	(15.5)	(17.7)	(16.4)	(11.7)	(6.3)	(4.0)	(100.0)				
平均	46.59	49.09	49.70	51.04	51.48	52.26	52.41	52.07	51.01	50.02	51.24	49.64	51.20		
標準偏差	16.43	17.01	16.64	16.98	17.18	17.98	16.87	17.63	16.92	17.97	17.29	17.25	17.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査