

表 3200 糖尿病の有無 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)	104,551 (46.9)	118,504 (53.1)	223,055 (100.0)	32,586		255,641
血液透析濾過 (%)	20,112 (54.1)	17,051 (45.9)	37,163 (100.0)	6,120		43,283
血液濾過 (%)	11 (20.4)	43 (79.6)	54 (100.0)	38		92
血液吸着透析 (%)	1,214 (89.9)	137 (10.1)	1,351 (100.0)	279		1,630
在宅血液透析 (%)	297 (75.2)	98 (24.8)	395 (100.0)	126		521
腹膜透析 (%)	3,673 (51.8)	3,420 (48.2)	7,093 (100.0)	1,848		8,941
合計 (%)	129,858 (48.3)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108
記載なし (%)						
総計 (%)	129,858 (48.3)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査