

表 3202 糖尿病の有無 併用の状況別（透析患者全体）

併用の状況	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独	126,011 (%)	135,704 (51.9)	261,715 (100.0)	39,079		300,794
PD単独	2,894 (%)	2,758 (48.8)	5,652 (100.0)	1,536		7,188
HD(F)単独.PDカテ あり	134 (%)	84 (38.5)	218 (100.0)	51		269
PD.HD併用週1	674 (%)	582 (46.3)	1,256 (100.0)	288		1,544
PD.HD併用週2	82 (%)	78 (48.8)	160 (100.0)	17		177
PD.HD併用週3	17 (%)	18 (51.4)	35 (100.0)	5		40
PD.HD併用週4	1 (100.0)		1 (100.0)			1
PD.HD併用その他	41 (%)	21 (33.9)	62 (100.0)	11		73
合計	129,854 (%)	139,245 (51.7)	269,099 (100.0)	40,987		310,086
不明	4 (%)	8 (66.7)	12 (100.0)	10		22
記載なし						
総計	129,858 (%)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査