

表 3203 糖尿病の有無 性別（透析患者全体）

| 性別 | 糖尿病なし | 糖尿病あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|------|---------|
| 男性 (%) | 76,898 (44.3) | 96,863 (55.7) | 173,761 (100.0) | 24,380 | | 198,141 |
| 女性 (%) | 52,960 (55.5) | 42,390 (44.5) | 95,350 (100.0) | 16,617 | | 111,967 |
| 合計 (%) | 129,858 (48.3) | 139,253 (51.7) | 269,111 (100.0) | 40,997 | | 310,108 |
| 記載なし (%) | | | | | | |
| 総計 (%) | 129,858 (48.3) | 139,253 (51.7) | 269,111 (100.0) | 40,997 | | 310,108 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往が**あり**の患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往が**なし**の患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載の**なかった**患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査