

表 3204 糖尿病の有無 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	68 (93.2)	5 (6.8)	73 (100.0)	44		117
15歳～ (%)	758 (90.8)	77 (9.2)	835 (100.0)	202		1,037
30歳～ (%)	7,461 (61.0)	4,775 (39.0)	12,236 (100.0)	2,149		14,385
45歳～ (%)	24,292 (49.2)	25,033 (50.8)	49,325 (100.0)	7,243		56,568
60歳～ (%)	55,802 (45.0)	68,300 (55.0)	124,102 (100.0)	17,876		141,978
75歳～ (%)	38,741 (49.4)	39,630 (50.6)	78,371 (100.0)	12,626		90,997
90歳～ (%)	2,729 (65.7)	1,427 (34.3)	4,156 (100.0)	849		5,005
合計 (%)	129,851 (48.3)	139,247 (51.7)	269,098 (100.0)	40,989		310,087
不明 (%)	7 (53.8)	6 (46.2)	13 (100.0)	8		21
記載なし (%)						
総計 (%)	129,858 (48.3)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108
平均	67.25	67.75	67.51	67.73		67.54
標準偏差	13.39	11.36	12.38	13.19		12.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査