

表 3205 糖尿病の有無 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	23,521 (38.8)	37,044 (61.2)	60,565 (100.0)	7,577		68,142
2年～ (%)	26,577 (38.6)	42,293 (61.4)	68,870 (100.0)	9,073		77,943
5年～ (%)	29,406 (42.9)	39,189 (57.1)	68,595 (100.0)	9,267		77,862
10年～ (%)	19,427 (57.2)	14,557 (42.8)	33,984 (100.0)	6,048		40,032
15年～ (%)	12,996 (75.2)	4,293 (24.8)	17,289 (100.0)	3,924		21,213
20年～ (%)	8,255 (87.3)	1,199 (12.7)	9,454 (100.0)	2,348		11,802
25年～ (%)	4,779 (92.4)	391 (7.6)	5,170 (100.0)	1,381		6,551
30年～ (%)	2,967 (94.8)	164 (5.2)	3,131 (100.0)	829		3,960
35年～ (%)	1,578 (95.5)	75 (4.5)	1,653 (100.0)	413		2,066
40年～ (%)	334 (95.2)	17 (4.8)	351 (100.0)	100		451
合計 (%)	129,840 (48.3)	139,222 (51.7)	269,062 (100.0)	40,960		310,022
不明 (%)	18 (36.7)	31 (63.3)	49 (100.0)	37		86
記載なし (%)						
総計 (%)	129,858 (48.3)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108
平均	9.33	4.92	7.05	8.90		7.29
標準偏差	8.74	4.73	7.30	8.49		7.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査