

表 3206 糖尿病の有無 原疾患別（透析患者全体）

原疾患	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	67,141 (88.3)	8,913 (11.7)	76,054 (100.0)	20,916		96,970
慢性腎孟腎炎 (%)	2,121 (87.5)	303 (12.5)	2,424 (100.0)	618		3,042
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1,534 (77.7)	441 (22.3)	1,975 (100.0)	519		2,494
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1,169 (90.8)	119 (9.2)	1,288 (100.0)	326		1,614
その他の分類不能の腎炎 (%)	932 (87.0)	139 (13.0)	1,071 (100.0)	302		1,373
多発性囊胞腎 (%)	8,002 (92.0)	697 (8.0)	8,699 (100.0)	2,307		11,006
腎硬化症 (%)	19,066 (83.6)	3,753 (16.4)	22,819 (100.0)	5,479		28,298
悪性高血圧 (%)	1,756 (87.4)	254 (12.6)	2,010 (100.0)	563		2,573
糖尿病性腎症 (%)		118,081 (100.0)	118,081 (100.0)			118,081
SLE腎炎 (%)	1,501 (84.6)	273 (15.4)	1,774 (100.0)	462		2,236
アミロイド腎 (%)	284 (82.1)	62 (17.9)	346 (100.0)	105		451
痛風腎 (%)	807 (89.0)	100 (11.0)	907 (100.0)	206		1,113
先天性代謝異常による腎不全 (%)	187 (87.4)	27 (12.6)	214 (100.0)	58		272
腎・尿路結核 (%)	144 (92.3)	12 (7.7)	156 (100.0)	50		206
腎・尿路結石 (%)	398 (87.7)	56 (12.3)	454 (100.0)	127		581
腎・尿路腫瘍 (%)	584 (85.4)	100 (14.6)	684 (100.0)	202		886
閉塞性尿路障害 (%)	532 (90.8)	54 (9.2)	586 (100.0)	137		723
骨髄腫 (%)	192 (85.7)	32 (14.3)	224 (100.0)	52		276
腎形成不全 (%)	498 (93.8)	33 (6.2)	531 (100.0)	118		649
不明 (%)	16,999 (80.3)	4,161 (19.7)	21,160 (100.0)	6,384		27,544
再導入 (%)	1,459 (84.0)	278 (16.0)	1,737 (100.0)	426		2,163
その他 (%)	4,552 (76.9)	1,365 (23.1)	5,917 (100.0)	1,640		7,557
合計 (%)	129,858 (48.3)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108
記載なし (%)						
総計 (%)	129,858 (48.3)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査