

表 3208 糖尿病の有無 週透析回数(回/週)別 (透析患者全体)

週透析回数	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
1回 (%)	916 (56.2)	714 (43.8)	1,630 (100.0)	210		1,840
2回 (%)	2,772 (49.9)	2,784 (50.1)	5,556 (100.0)	636		6,192
3回 (%)	121,367 (49.7)	123,049 (50.3)	244,416 (100.0)	26,223		270,639
4回 (%)	495 (53.3)	433 (46.7)	928 (100.0)	66		994
5回 (%)	56 (68.3)	26 (31.7)	82 (100.0)	7		89
6回 (%)	46 (76.7)	14 (23.3)	60 (100.0)	21		81
7回 (%)	20 (69.0)	9 (31.0)	29 (100.0)	1		30
合計 (%)	125,672 (49.7)	127,029 (50.3)	252,701 (100.0)	27,164		279,865
記載なし (%)	4,186 (25.5)	12,224 (74.5)	16,410 (100.0)	13,833		30,243
総計 (%)	129,858 (48.3)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108
平均	2.97	2.97	2.97	2.97		2.97
標準偏差	0.25	0.22	0.24	0.25		0.24

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がない患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査