

表 3209 糖尿病の有無 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (透析患者全体)

透析前アルブミン濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	72 (41.1)	103 (58.9)	175 (100.0)	10		185
1.5～ (%)	353 (39.0)	551 (61.0)	904 (100.0)	85		989
2.0～ (%)	1,580 (42.5)	2,141 (57.5)	3,721 (100.0)	340		4,061
2.5～ (%)	6,522 (46.5)	7,510 (53.5)	14,032 (100.0)	1,404		15,436
3.0～ (%)	29,641 (49.4)	30,380 (50.6)	60,021 (100.0)	6,087		66,108
3.5～ (%)	62,193 (50.7)	60,482 (49.3)	122,675 (100.0)	12,560		135,235
4.0～ (%)	23,043 (50.5)	22,618 (49.5)	45,661 (100.0)	4,847		50,508
4.5～ (%)	1,474 (55.8)	1,166 (44.2)	2,640 (100.0)	274		2,914
5.0～ (%)	115 (59.6)	78 (40.4)	193 (100.0)	10		203
合計 (%)	124,993 (50.0)	125,029 (50.0)	250,022 (100.0)	25,617		275,639
記載なし (%)	4,865 (25.5)	14,224 (74.5)	19,089 (100.0)	15,380		34,469
総計 (%)	129,858 (48.3)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108
平均	3.61	3.58	3.60	3.60		3.60
標準偏差	0.43	0.45	0.44	0.44		0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査