

表 3210 糖尿病の有無 透析前CRP濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前CRP濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	63,192 (51.4)	59,647 (48.6)	122,839 (100.0)	12,470		135,309
0.2～ (%)	20,009 (48.9)	20,929 (51.1)	40,938 (100.0)	3,869		44,807
0.5～ (%)	9,735 (47.0)	10,964 (53.0)	20,699 (100.0)	2,058		22,757
1.0～ (%)	6,288 (46.6)	7,198 (53.4)	13,486 (100.0)	1,262		14,748
2.0～ (%)	3,781 (46.1)	4,420 (53.9)	8,201 (100.0)	804		9,005
4.0～ (%)	1,359 (46.4)	1,571 (53.6)	2,930 (100.0)	314		3,244
6.0～ (%)	651 (45.5)	781 (54.5)	1,432 (100.0)	144		1,576
8.0～ (%)	348 (44.1)	441 (55.9)	789 (100.0)	81		870
10.0～ (%)	436 (46.1)	510 (53.9)	946 (100.0)	88		1,034
15.0～ (%)	278 (44.8)	343 (55.2)	621 (100.0)	72		693
合計 (%)	106,077 (49.8)	106,804 (50.2)	212,881 (100.0)	21,162		234,043
記載なし (%)	23,781 (42.3)	32,449 (57.7)	56,230 (100.0)	19,835		76,065
総計 (%)	129,858 (48.3)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108
平均	0.59	0.67	0.63	0.63		0.63
標準偏差	1.87	1.96	1.92	1.95		1.92

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査