

表 3211 糖尿病の有無 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別(透析患者全体)

透析前補正 カルシウム濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	524 (50.0)	524 (50.0)	1,048 (100.0)	94		1,142
7.0～ (%)	734 (48.9)	767 (51.1)	1,501 (100.0)	148		1,649
7.5～ (%)	2,759 (47.6)	3,040 (52.4)	5,799 (100.0)	600		6,399
8.0～ (%)	8,327 (44.7)	10,286 (55.3)	18,613 (100.0)	1,826		20,439
8.4～ (%)	2,464 (45.7)	2,931 (54.3)	5,395 (100.0)	477		5,872
8.5～ (%)	28,430 (46.3)	32,999 (53.7)	61,429 (100.0)	5,890		67,319
9.0～ (%)	37,110 (49.8)	37,414 (50.2)	74,524 (100.0)	7,480		82,004
9.5～ (%)	26,210 (53.8)	22,552 (46.2)	48,762 (100.0)	5,207		53,969
10.0～ (%)	3,286 (55.4)	2,648 (44.6)	5,934 (100.0)	664		6,598
10.1～ (%)	8,578 (56.5)	6,607 (43.5)	15,185 (100.0)	1,792		16,977
10.5～ (%)	4,199 (56.7)	3,211 (43.3)	7,410 (100.0)	860		8,270
11.0～ (%)	1,403 (56.7)	1,073 (43.3)	2,476 (100.0)	305		2,781
11.5～ (%)	474 (54.7)	392 (45.3)	866 (100.0)	107		973
12.0～ (%)	326 (53.7)	281 (46.3)	607 (100.0)	74		681
合計 (%)	124,824 (50.0)	124,725 (50.0)	249,549 (100.0)	25,524		275,073
記載なし (%)	5,034 (25.7)	14,528 (74.3)	19,562 (100.0)	15,473		35,035
総計 (%)	129,858 (48.3)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108
平均	9.23	9.13	9.18	9.23		9.19
標準偏差	0.75	0.73	0.74	0.76		0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査