

表 3212 糖尿病の有無 透析前リン濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前リン濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	4,580 (46.5)	5,276 (53.5)	9,856 (100.0)	1,030		10,886
3.0～ (%)	5,906 (48.0)	6,391 (52.0)	12,297 (100.0)	1,285		13,582
3.5～ (%)	10,427 (48.4)	11,128 (51.6)	21,555 (100.0)	2,127		23,682
4.0～ (%)	15,802 (49.3)	16,248 (50.7)	32,050 (100.0)	3,232		35,282
4.5～ (%)	19,121 (50.1)	19,035 (49.9)	38,156 (100.0)	3,903		42,059
5.0～ (%)	19,834 (51.4)	18,785 (48.6)	38,619 (100.0)	4,099		42,718
5.5～ (%)	17,119 (51.5)	16,113 (48.5)	33,232 (100.0)	3,473		36,705
6.0～ (%)	2,952 (52.4)	2,681 (47.6)	5,633 (100.0)	628		6,261
6.1～ (%)	9,627 (50.5)	9,449 (49.5)	19,076 (100.0)	2,033		21,109
6.5～ (%)	8,346 (50.4)	8,201 (49.6)	16,547 (100.0)	1,731		18,278
7.0～ (%)	5,040 (49.5)	5,144 (50.5)	10,184 (100.0)	1,093		11,277
7.5～ (%)	3,086 (49.5)	3,145 (50.5)	6,231 (100.0)	627		6,858
8.0～ (%)	1,805 (48.6)	1,906 (51.4)	3,711 (100.0)	342		4,053
8.5～ (%)	1,169 (50.1)	1,164 (49.9)	2,333 (100.0)	239		2,572
9.0～ (%)	1,810 (49.2)	1,870 (50.8)	3,680 (100.0)	397		4,077
合計 (%)	126,624 (50.0)	126,536 (50.0)	253,160 (100.0)	26,239		279,399
記載なし (%)	3,234 (20.3)	12,717 (79.7)	15,951 (100.0)	14,758		30,709
総計 (%)	129,858 (48.3)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108
平均	5.23	5.19	5.21	5.22		5.21
標準偏差	1.41	1.44	1.43	1.43		1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査