

表 3214 糖尿病の有無 PTH値(pg/mL)別 (透析患者全体) PTH測定法:whole-PTH

PTH値	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	833 (47.8)	908 (52.2)	1,741 (100.0)	153		1,894
20～ (%)	1,054 (49.0)	1,098 (51.0)	2,152 (100.0)	179		2,331
35～ (%)	945 (50.5)	925 (49.5)	1,870 (100.0)	173		2,043
50～ (%)	1,437 (49.8)	1,446 (50.2)	2,883 (100.0)	270		3,153
75～ (%)	1,269 (50.9)	1,226 (49.1)	2,495 (100.0)	253		2,748
100～ (%)	1,029 (49.4)	1,053 (50.6)	2,082 (100.0)	216		2,298
125～ (%)	703 (51.8)	654 (48.2)	1,357 (100.0)	182		1,539
150～ (%)	21 (48.8)	22 (51.2)	43 (100.0)	5		48
151～ (%)	604 (53.5)	526 (46.5)	1,130 (100.0)	133		1,263
180～ (%)	429 (53.4)	374 (46.6)	803 (100.0)	72		875
210～ (%)	292 (51.0)	281 (49.0)	573 (100.0)	55		628
240～ (%)	349 (57.4)	259 (42.6)	608 (100.0)	66		674
300～ (%)	145 (58.7)	102 (41.3)	247 (100.0)	37		284
350～ (%)	92 (56.4)	71 (43.6)	163 (100.0)	16		179
400～ (%)	107 (60.5)	70 (39.5)	177 (100.0)	25		202
500～ (%)	142 (65.4)	75 (34.6)	217 (100.0)	30		247
合計 (%)	9,451 (51.0)	9,090 (49.0)	18,541 (100.0)	1,865		20,406
記載なし (%)	191 (40.3)	283 (59.7)	474 (100.0)	183		657
総計 (%)	9,642 (50.7)	9,373 (49.3)	19,015 (100.0)	2,048		21,063
平均	112.71	101.10	107.02	117.82		108.01
標準偏差	122.88	100.86	112.77	125.35		114.01

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査