

表 3215 糖尿病の有無 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別 (透析患者全体)

透析前ヘモグロビン濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
5未満 (%)	168 (57.7)	123 (42.3)	291 (100.0)	12		303
5～ (%)	167 (41.3)	237 (58.7)	404 (100.0)	25		429
6～ (%)	472 (44.6)	587 (55.4)	1,059 (100.0)	101		1,160
7～ (%)	1,920 (47.4)	2,128 (52.6)	4,048 (100.0)	387		4,435
8～ (%)	6,364 (47.9)	6,924 (52.1)	13,288 (100.0)	1,266		14,554
9～ (%)	20,464 (49.0)	21,295 (51.0)	41,759 (100.0)	4,230		45,989
10～ (%)	42,961 (50.5)	42,131 (49.5)	85,092 (100.0)	8,820		93,912
11～ (%)	35,967 (50.8)	34,844 (49.2)	70,811 (100.0)	7,362		78,173
12～ (%)	13,283 (50.5)	13,036 (49.5)	26,319 (100.0)	2,535		28,854
13～ (%)	3,244 (48.8)	3,410 (51.2)	6,654 (100.0)	654		7,308
14～ (%)	1,186 (48.4)	1,262 (51.6)	2,448 (100.0)	225		2,673
合計 (%)	126,196 (50.0)	125,977 (50.0)	252,173 (100.0)	25,617		277,790
記載なし (%)	3,662 (21.6)	13,276 (78.4)	16,938 (100.0)	15,380		32,318
総計 (%)	129,858 (48.3)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108
平均	10.72	10.70	10.71	10.72		10.71
標準偏差	1.27	1.30	1.29	1.24		1.28

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかつた患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査