

表 3216 糖尿病の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

| 総コレステロール濃度 | 糖尿病なし | 糖尿病あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|------|---------|
| 100未満 (%) | 2,488 (34.2) | 4,795 (65.8) | 7,283 (100.0) | 547 | | 7,830 |
| 100～ (%) | 8,114 (38.8) | 12,793 (61.2) | 20,907 (100.0) | 1,815 | | 22,722 |
| 120～ (%) | 17,423 (45.2) | 21,083 (54.8) | 38,506 (100.0) | 3,695 | | 42,201 |
| 140～ (%) | 21,908 (49.8) | 22,079 (50.2) | 43,987 (100.0) | 4,672 | | 48,659 |
| 160～ (%) | 19,681 (54.2) | 16,623 (45.8) | 36,304 (100.0) | 3,939 | | 40,243 |
| 180～ (%) | 13,105 (57.5) | 9,703 (42.5) | 22,808 (100.0) | 2,717 | | 25,525 |
| 200～ (%) | 7,184 (59.0) | 4,983 (41.0) | 12,167 (100.0) | 1,556 | | 13,723 |
| 220～ (%) | 3,204 (59.3) | 2,197 (40.7) | 5,401 (100.0) | 670 | | 6,071 |
| 240～ (%) | 1,299 (60.3) | 854 (39.7) | 2,153 (100.0) | 247 | | 2,400 |
| 260～ (%) | 790 (56.3) | 613 (43.7) | 1,403 (100.0) | 183 | | 1,586 |
| 合計 (%) | 95,196 (49.9) | 95,723 (50.1) | 190,919 (100.0) | 20,041 | | 210,960 |
| 記載なし (%) | 34,662 (44.3) | 43,530 (55.7) | 78,192 (100.0) | 20,956 | | 99,148 |
| 総計 (%) | 129,858 (48.3) | 139,253 (51.7) | 269,111 (100.0) | 40,997 | | 310,108 |
| 平均 | 160.11 | 150.84 | 155.46 | 159.66 | | 155.86 |
| 標準偏差 | 35.43 | 35.39 | 35.71 | 35.77 | | 35.74 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査