

表 3217 糖尿病の有無 HDL-C濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

HDL-C濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	257 (34.3)	492 (65.7)	749 (100.0)	47		796
20～ (%)	4,734 (32.3)	9,916 (67.7)	14,650 (100.0)	973		15,623
30～ (%)	17,549 (41.4)	24,826 (58.6)	42,375 (100.0)	3,472		45,847
40～ (%)	23,371 (49.9)	23,480 (50.1)	46,851 (100.0)	4,501		51,352
50～ (%)	18,934 (56.2)	14,773 (43.8)	33,707 (100.0)	3,854		37,561
60～ (%)	12,219 (61.6)	7,630 (38.4)	19,849 (100.0)	2,387		22,236
70～ (%)	6,237 (64.4)	3,448 (35.6)	9,685 (100.0)	1,307		10,992
80～ (%)	2,995 (65.3)	1,593 (34.7)	4,588 (100.0)	641		5,229
90～ (%)	1,319 (65.7)	689 (34.3)	2,008 (100.0)	323		2,331
100～ (%)	1,097 (64.1)	614 (35.9)	1,711 (100.0)	290		2,001
合計 (%)	88,712 (50.4)	87,461 (49.6)	176,173 (100.0)	17,795		193,968
記載なし (%)	41,146 (44.3)	51,792 (55.7)	92,938 (100.0)	23,202		116,140
総計 (%)	129,858 (48.3)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108
平均	51.33	45.48	48.42	51.99		48.75
標準偏差	16.87	15.68	16.55	17.83		16.71

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

\*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査