

表 3218 糖尿病の有無 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

| Non-HDL-C濃度 | 糖尿病なし | 糖尿病あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|------|---------|
| 50未満 (%) | 1,313 (42.4) | 1,786 (57.6) | 3,099 (100.0) | 311 | | 3,410 |
| 50～ (%) | 6,304 (43.2) | 8,294 (56.8) | 14,598 (100.0) | 1,503 | | 16,101 |
| 70～ (%) | 15,229 (47.3) | 16,953 (52.7) | 32,182 (100.0) | 3,387 | | 35,569 |
| 90～ (%) | 19,237 (50.3) | 19,025 (49.7) | 38,262 (100.0) | 4,116 | | 42,378 |
| 110～ (%) | 16,359 (52.9) | 14,590 (47.1) | 30,949 (100.0) | 3,254 | | 34,203 |
| 130～ (%) | 10,183 (53.8) | 8,734 (46.2) | 18,917 (100.0) | 2,046 | | 20,963 |
| 150～ (%) | 5,051 (53.1) | 4,454 (46.9) | 9,505 (100.0) | 1,085 | | 10,590 |
| 170～ (%) | 2,191 (51.4) | 2,075 (48.6) | 4,266 (100.0) | 456 | | 4,722 |
| 190～ (%) | 822 (49.2) | 850 (50.8) | 1,672 (100.0) | 137 | | 1,809 |
| 210～ (%) | 472 (47.1) | 530 (52.9) | 1,002 (100.0) | 122 | | 1,124 |
| 合計 (%) | 77,161 (50.0) | 77,291 (50.0) | 154,452 (100.0) | 16,417 | | 170,869 |
| 記載なし (%) | 52,697 (46.0) | 61,962 (54.0) | 114,659 (100.0) | 24,580 | | 139,239 |
| 総計 (%) | 129,858 (48.3) | 139,253 (51.7) | 269,111 (100.0) | 40,997 | | 310,108 |
| 平均 | 108.80 | 105.28 | 107.04 | 107.50 | | 107.08 |
| 標準偏差 | 33.09 | 34.04 | 33.61 | 33.55 | | 33.61 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査