

表 3219 糖尿病の有無 透析前収縮期血圧(mmHg)別 (透析患者全体)

透析前収縮期血圧	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	27 (75.0)	9 (25.0)	36 (100.0)	4		40
60～ (%)	263 (69.8)	114 (30.2)	377 (100.0)	56		433
80～ (%)	1,977 (66.5)	996 (33.5)	2,973 (100.0)	365		3,338
100～ (%)	9,741 (62.1)	5,950 (37.9)	15,691 (100.0)	1,916		17,607
120～ (%)	27,782 (58.1)	20,032 (41.9)	47,814 (100.0)	5,457		53,271
140～ (%)	38,384 (52.3)	35,008 (47.7)	73,392 (100.0)	7,430		80,822
160～ (%)	23,672 (44.3)	29,800 (55.7)	53,472 (100.0)	4,723		58,195
180～ (%)	7,296 (35.2)	13,447 (64.8)	20,743 (100.0)	1,481		22,224
200～ (%)	1,409 (26.6)	3,881 (73.4)	5,290 (100.0)	256		5,546
220～ (%)	251 (23.1)	837 (76.9)	1,088 (100.0)	72		1,160
合計 (%)	110,802 (50.2)	110,074 (49.8)	220,876 (100.0)	21,760		242,636
記載なし (%)	19,056 (39.5)	29,179 (60.5)	48,235 (100.0)	19,237		67,472
総計 (%)	129,858 (48.3)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108
平均	147.21	155.79	151.49	147.48		151.13
標準偏差	23.20	24.60	24.29	23.28		24.23

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往が有りの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査