

表 3220 糖尿病の有無 透析前拡張期血圧(mmHg)別 (透析患者全体)

透析前拡張期血圧	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	40 (55.6)	32 (44.4)	72 (100.0)	8		80
20～ (%)	373 (53.4)	325 (46.6)	698 (100.0)	98		796
40～ (%)	8,992 (48.2)	9,682 (51.8)	18,674 (100.0)	1,806		20,480
60～ (%)	49,524 (48.5)	52,537 (51.5)	102,061 (100.0)	9,817		111,878
80～ (%)	28,134 (51.9)	26,094 (48.1)	54,228 (100.0)	5,459		59,687
90～ (%)	15,504 (53.0)	13,729 (47.0)	29,233 (100.0)	3,018		32,251
100～ (%)	7,420 (51.6)	6,953 (48.4)	14,373 (100.0)	1,398		15,771
120～ (%)	440 (50.5)	432 (49.5)	872 (100.0)	92		964
140～ (%)	32 (48.5)	34 (51.5)	66 (100.0)	9		75
合計 (%)	110,459 (50.1)	109,818 (49.9)	220,277 (100.0)	21,705		241,982
記載なし (%)	19,399 (39.7)	29,435 (60.3)	48,834 (100.0)	19,292		68,126
総計 (%)	129,858 (48.3)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108
平均	78.19	77.31	77.75	78.02		77.77
標準偏差	14.46	14.41	14.44	14.54		14.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査