

表 3221 糖尿病の有無 透析前脈拍(拍/分)別 (透析患者全体)

透析前脈拍	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
40未満 (%)	64 (38.3)	103 (61.7)	167 (100.0)	18		185
40～ (%)	1,123 (51.6)	1,052 (48.4)	2,175 (100.0)	206		2,381
50～ (%)	9,727 (55.0)	7,943 (45.0)	17,670 (100.0)	1,842		19,512
60～ (%)	29,536 (53.7)	25,478 (46.3)	55,014 (100.0)	5,767		60,781
70～ (%)	33,887 (50.8)	32,881 (49.2)	66,768 (100.0)	6,504		73,272
80～ (%)	19,662 (46.0)	23,106 (54.0)	42,768 (100.0)	4,046		46,814
90～ (%)	8,289 (43.7)	10,672 (56.3)	18,961 (100.0)	1,629		20,590
100～ (%)	2,630 (44.5)	3,284 (55.5)	5,914 (100.0)	479		6,393
110～ (%)	707 (50.3)	698 (49.7)	1,405 (100.0)	123		1,528
120～ (%)	339 (56.5)	261 (43.5)	600 (100.0)	55		655
合計 (%)	105,964 (50.1)	105,478 (49.9)	211,442 (100.0)	20,669		232,111
記載なし (%)	23,894 (41.4)	33,775 (58.6)	57,669 (100.0)	20,328		77,997
総計 (%)	129,858 (48.3)	139,253 (51.7)	269,111 (100.0)	40,997		310,108
平均	73.93	75.59	74.75	74.01		74.69
標準偏差	12.77	12.90	12.86	12.57		12.84

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査