

表 3222 透析前アルブミン濃度(g/dL) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 (%)	159 (0.1)	852 (0.4)	3,435 (1.5)	12,892 (5.7)	54,438 (23.9)	111,197 (48.8)	42,314 (18.6)	2,504 (1.1)	178 (0.1)	227,969 (100.0)	27,672	255,641	3.60	0.45
血液透析濾過 (%)	11 (0.0)	66 (0.2)	309 (0.8)	1,436 (3.6)	9,026 (22.7)	21,131 (53.2)	7,373 (18.6)	332 (0.8)	19 (0.0)	39,703 (100.0)	3,580	43,283	3.64	0.39
血液濾過 (%)			3 (3.4)	2 (2.2)	21 (23.6)	48 (53.9)	12 (13.5)	2 (2.2)	1 (1.1)	89 (100.0)	3	92	3.61	0.46
血液吸着透析 (%)			15 (1.0)	63 (4.1)	426 (27.6)	810 (52.5)	221 (14.3)	7 (0.5)	2 (0.1)	1,544 (100.0)	86	1,630	3.59	0.38
在宅血液透析 (%)			1 (0.3)	6 (1.5)	39 (9.9)	143 (36.2)	157 (39.7)	48 (12.2)	1 (0.3)	395 (100.0)	126	521	3.95	0.42
腹膜透析 (%)	15 (0.3)	71 (1.2)	298 (5.0)	1,037 (17.5)	2,158 (36.3)	1,906 (32.1)	431 (7.3)	21 (0.4)	2 (0.0)	5,939 (100.0)	3,002	8,941	3.28	0.52
合計 (%)	185 (0.1)	989 (0.4)	4,061 (1.5)	15,436 (5.6)	66,108 (24.0)	135,235 (49.1)	50,508 (18.3)	2,914 (1.1)	203 (0.1)	275,639 (100.0)	34,469	310,108	3.60	0.44
記載なし (%)														
総計 (%)	185 (0.1)	989 (0.4)	4,061 (1.5)	15,436 (5.6)	66,108 (24.0)	135,235 (49.1)	50,508 (18.3)	2,914 (1.1)	203 (0.1)	275,639 (100.0)	34,469	310,108	3.60	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査