

表 3225 透析前アルブミン濃度(g/dL) 性別（透析患者全体）

性別	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	117 (0.1)	649 (0.4)	2,428 (1.4)	9,141 (5.2)	40,124 (22.8)	86,028 (48.8)	35,315 (20.0)	2,251 (1.3)	144 (0.1)	176,197 (100.0)	21,944	198,141	3.62	0.45
女性 (%)	68 (0.1)	340 (0.3)	1,633 (1.6)	6,295 (6.3)	25,984 (26.1)	49,207 (49.5)	15,193 (15.3)	663 (0.7)	59 (0.1)	99,442 (100.0)	12,525	111,967	3.56	0.44
合計 (%)	185 (0.1)	989 (0.4)	4,061 (1.5)	15,436 (5.6)	66,108 (24.0)	135,235 (49.1)	50,508 (18.3)	2,914 (1.1)	203 (0.1)	275,639 (100.0)	34,469	310,108	3.60	0.44
記載なし (%)														
総計 (%)	185 (0.1)	989 (0.4)	4,061 (1.5)	15,436 (5.6)	66,108 (24.0)	135,235 (49.1)	50,508 (18.3)	2,914 (1.1)	203 (0.1)	275,639 (100.0)	34,469	310,108	3.60	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査