

表 3226 透析前アルブミン濃度(g/dL) 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		2 (2.9)	3 (4.3)	11 (15.7)	17 (24.3)	26 (37.1)	10 (14.3)	1 (1.4)		70 (100.0)	47	117	3.39	0.59
15歳～ (%)	2 (0.2)	2 (0.2)	6 (0.7)	17 (1.9)	89 (9.9)	282 (31.5)	407 (45.4)	86 (9.6)	5 (0.6)	896 (100.0)	141	1,037	3.95	0.47
30歳～ (%)	1 (0.0)	26 (0.2)	70 (0.5)	229 (1.8)	1,350 (10.5)	5,670 (44.3)	4,879 (38.1)	558 (4.4)	25 (0.2)	12,808 (100.0)	1,577	14,385	3.86	0.41
45歳～ (%)	20 (0.0)	86 (0.2)	325 (0.6)	1,222 (2.4)	7,092 (14.1)	25,506 (50.7)	14,996 (29.8)	1,037 (2.1)	45 (0.1)	50,329 (100.0)	6,239	56,568	3.76	0.40
60歳～ (%)	83 (0.1)	403 (0.3)	1,438 (1.1)	5,687 (4.5)	28,583 (22.6)	66,170 (52.3)	22,997 (18.2)	1,002 (0.8)	77 (0.1)	126,440 (100.0)	15,538	141,978	3.62	0.42
75歳～ (%)	76 (0.1)	430 (0.5)	2,026 (2.5)	7,504 (9.3)	27,173 (33.7)	36,134 (44.8)	7,060 (8.8)	226 (0.3)	49 (0.1)	80,678 (100.0)	10,319	90,997	3.44	0.45
90歳～ (%)	3 (0.1)	40 (0.9)	191 (4.3)	761 (17.3)	1,798 (40.9)	1,443 (32.8)	156 (3.5)	4 (0.1)	2 (0.0)	4,398 (100.0)	607	5,005	3.26	0.46
合計 (%)	185 (0.1)	989 (0.4)	4,059 (1.5)	15,431 (5.6)	66,102 (24.0)	135,231 (49.1)	50,505 (18.3)	2,914 (1.1)	203 (0.1)	275,619 (100.0)	34,468	310,087	3.60	0.44
不明 (%)			2 (10.0)	5 (25.0)	6 (30.0)	4 (20.0)	3 (15.0)			20 (100.0)	1	21	3.20	0.60
記載なし (%)														
総計 (%)	185 (0.1)	989 (0.4)	4,061 (1.5)	15,436 (5.6)	66,108 (24.0)	135,235 (49.1)	50,508 (18.3)	2,914 (1.1)	203 (0.1)	275,639 (100.0)	34,469	310,108	3.60	0.44
平均	71.54	72.36	74.08	74.07	71.69	67.06	61.39	55.66	62.85	67.52	67.66	67.54		
標準偏差	11.65	11.97	11.35	11.26	11.28	11.80	12.51	13.73	15.40	12.46	12.80	12.49		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査