

表 3237 透析前アルブミン濃度(g/dL) 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

総コレステロール濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)	40 (0.5)	197 (2.5)	518 (6.7)	1,124 (14.5)	2,344 (30.2)	2,774 (35.8)	715 (9.2)	42 (0.5)	5 (0.1)	7,759 (100.0)	71	7,830	3.29	0.59
100～ (%)	22 (0.1)	148 (0.7)	602 (2.7)	1,969 (8.7)	6,719 (29.8)	9,970 (44.3)	2,933 (13.0)	145 (0.6)	20 (0.1)	22,528 (100.0)	194	22,722	3.48	0.48
120～ (%)	16 (0.0)	120 (0.3)	594 (1.4)	2,616 (6.3)	11,250 (26.9)	20,277 (48.5)	6,613 (15.8)	329 (0.8)	21 (0.1)	41,836 (100.0)	365	42,201	3.56	0.43
140～ (%)	20 (0.0)	83 (0.2)	474 (1.0)	2,246 (4.7)	11,619 (24.1)	24,212 (50.2)	9,079 (18.8)	477 (1.0)	34 (0.1)	48,244 (100.0)	415	48,659	3.62	0.41
160～ (%)	5 (0.0)	34 (0.1)	271 (0.7)	1,548 (3.9)	8,621 (21.6)	20,699 (51.9)	8,222 (20.6)	480 (1.2)	28 (0.1)	39,908 (100.0)	335	40,243	3.66	0.40
180～ (%)	6 (0.0)	34 (0.1)	154 (0.6)	941 (3.7)	5,100 (20.2)	13,005 (51.4)	5,673 (22.4)	362 (1.4)	22 (0.1)	25,297 (100.0)	228	25,525	3.68	0.40
200～ (%)	3 (0.0)	14 (0.1)	81 (0.6)	472 (3.5)	2,556 (18.8)	7,040 (51.8)	3,191 (23.5)	222 (1.6)	14 (0.1)	13,593 (100.0)	130	13,723	3.70	0.40
220～ (%)	4 (0.1)	8 (0.1)	60 (1.0)	239 (4.0)	1,170 (19.4)	2,938 (48.8)	1,484 (24.7)	111 (1.8)	2 (0.0)	6,016 (100.0)	55	6,071	3.69	0.42
240～ (%)	2 (0.1)	9 (0.4)	26 (1.1)	96 (4.0)	494 (20.8)	1,125 (47.4)	568 (23.9)	50 (2.1)	4 (0.2)	2,374 (100.0)	26	2,400	3.67	0.45
260～ (%)	8 (0.5)	9 (0.6)	40 (2.5)	99 (6.3)	335 (21.4)	717 (45.7)	327 (20.8)	32 (2.0)	2 (0.1)	1,569 (100.0)	17	1,586	3.60	0.53
合計 (%)	126 (0.1)	656 (0.3)	2,820 (1.3)	11,350 (5.4)	50,208 (24.0)	102,757 (49.1)	38,805 (18.6)	2,250 (1.1)	152 (0.1)	209,124 (100.0)	1,836	210,960	3.60	0.44
記載なし (%)	59 (0.1)	333 (0.5)	1,241 (1.9)	4,086 (6.1)	15,900 (23.9)	32,478 (48.8)	11,703 (17.6)	664 (1.0)	51 (0.1)	66,515 (100.0)	32,633	99,148	3.58	0.46
総計 (%)	185 (0.1)	989 (0.4)	4,061 (1.5)	15,436 (5.6)	66,108 (24.0)	135,235 (49.1)	50,508 (18.3)	2,914 (1.1)	203 (0.1)	275,639 (100.0)	34,469	310,108	3.60	0.44
平均	133.85	124.12	135.37	143.93	151.08	157.49	162.58	167.44	160.39	155.85	156.70	155.86		
標準偏差	62.56	46.02	42.89	38.12	35.29	34.62	34.91	37.19	40.46	35.73	36.87	35.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査