

表 3241 透析前アルブミン濃度(g/dL) 透析前拡張期血圧(mmHg)別（透析患者全体）

透析前拡張 期血圧	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	1 (1.3)			5 (6.5)	21 (27.3)	36 (46.8)	14 (18.2)			77 (100.0)	3	80	3.57	0.46
20～ (%)	4 (0.5)	17 (2.2)	32 (4.1)	120 (15.5)	266 (34.3)	284 (36.6)	49 (6.3)	3 (0.4)		775 (100.0)	21	796	3.30	0.54
40～ (%)	40 (0.2)	192 (1.0)	606 (3.0)	2,143 (10.7)	6,625 (33.1)	8,459 (42.2)	1,885 (9.4)	72 (0.4)	8 (0.0)	20,030 (100.0)	450	20,480	3.41	0.48
60～ (%)	64 (0.1)	411 (0.4)	1,793 (1.6)	6,763 (6.2)	29,039 (26.5)	53,979 (49.2)	16,743 (15.3)	817 (0.7)	78 (0.1)	109,687 (100.0)	2,191	111,878	3.56	0.44
80～ (%)	21 (0.0)	131 (0.2)	576 (1.0)	2,592 (4.4)	12,544 (21.4)	29,616 (50.5)	12,354 (21.1)	711 (1.2)	43 (0.1)	58,588 (100.0)	1,099	59,687	3.65	0.42
90～ (%)	16 (0.1)	68 (0.2)	304 (1.0)	1,136 (3.6)	5,963 (18.8)	16,036 (50.6)	7,667 (24.2)	504 (1.6)	19 (0.1)	31,713 (100.0)	538	32,251	3.69	0.42
100～ (%)	5 (0.0)	23 (0.1)	116 (0.7)	520 (3.4)	2,451 (15.8)	7,615 (49.1)	4,438 (28.6)	341 (2.2)	11 (0.1)	15,520 (100.0)	251	15,771	3.74	0.41
120～ (%)	1 (0.1)	3 (0.3)	4 (0.4)	28 (2.9)	138 (14.5)	447 (47.0)	306 (32.1)	25 (2.6)		952 (100.0)	12	964	3.76	0.42
140～ (%)			1 (1.4)		15 (21.1)	41 (57.7)	12 (16.9)	2 (2.8)		71 (100.0)	4	75	3.68	0.37
合計 (%)	152 (0.1)	845 (0.4)	3,432 (1.4)	13,307 (5.6)	57,062 (24.0)	116,513 (49.1)	43,468 (18.3)	2,475 (1.0)	159 (0.1)	237,413 (100.0)	4,569	241,982	3.60	0.44
記載なし (%)	33 (0.1)	144 (0.4)	629 (1.6)	2,129 (5.6)	9,046 (23.7)	18,722 (49.0)	7,040 (18.4)	439 (1.1)	44 (0.1)	38,226 (100.0)	29,900	68,126	3.60	0.45
総計 (%)	185 (0.1)	989 (0.4)	4,061 (1.5)	15,436 (5.6)	66,108 (24.0)	135,235 (49.1)	50,508 (18.3)	2,914 (1.1)	203 (0.1)	275,639 (100.0)	34,469	310,108	3.60	0.44
平均	69.97	69.85	71.94	72.82	75.02	78.32	81.85	84.23	78.35	77.80	76.39	77.77		
標準偏差	17.43	15.77	14.72	14.73	14.16	14.07	14.21	14.33	12.95	14.44	14.73	14.45		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査