

表 3243 透析前アルブミン濃度(g/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 （％）	95 (0.1)	510 (0.4)	1,911 (1.4)	7,185 (5.1)	31,685 (22.6)	68,505 (48.8)	28,500 (20.3)	1,837 (1.3)	122 (0.1)	140,350 (100.0)	6,683	147,033	3.62	0.45
女性 （％）	51 (0.1)	261 (0.3)	1,268 (1.6)	4,965 (6.4)	20,397 (26.1)	38,630 (49.4)	12,006 (15.4)	525 (0.7)	50 (0.1)	78,153 (100.0)	3,785	81,938	3.56	0.44
合計 （％）	146 (0.1)	771 (0.4)	3,179 (1.5)	12,150 (5.6)	52,082 (23.8)	107,135 (49.0)	40,506 (18.5)	2,362 (1.1)	172 (0.1)	218,503 (100.0)	10,468	228,971	3.60	0.44
記載なし （％）														
総計 （％）	146 (0.1)	771 (0.4)	3,179 (1.5)	12,150 (5.6)	52,082 (23.8)	107,135 (49.0)	40,506 (18.5)	2,362 (1.1)	172 (0.1)	218,503 (100.0)	10,468	228,971	3.60	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査