

表 3250 透析前アルブミン濃度(g/dL) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前補正 カルシウム濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)		1 (0.1)	12 (1.4)	37 (4.2)	142 (16.2)	448 (51.3)	221 (25.3)	9 (1.0)	4 (0.5)	874 (100.0)		874	3.69	0.43
7.0～ (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	2 (0.2)	22 (1.7)	182 (14.4)	666 (52.6)	368 (29.1)	21 (1.7)	3 (0.2)	1,266 (100.0)		1,266	3.76	0.37
7.5～ (%)		1 (0.0)	21 (0.4)	83 (1.7)	747 (15.0)	2,712 (54.6)	1,338 (26.9)	57 (1.1)	12 (0.2)	4,971 (100.0)		4,971	3.75	0.36
8.0～ (%)		6 (0.0)	47 (0.3)	312 (1.9)	2,526 (15.5)	9,575 (58.8)	3,646 (22.4)	157 (1.0)	21 (0.1)	16,290 (100.0)		16,290	3.73	0.34
8.4～ (%)	1 (0.0)	4 (0.1)	22 (0.5)	105 (2.2)	910 (19.5)	2,008 (42.9)	1,547 (33.1)	72 (1.5)	7 (0.1)	4,676 (100.0)		4,676	3.74	0.39
8.5～ (%)	4 (0.0)	36 (0.1)	234 (0.4)	1,634 (9.8)	11,205 (20.8)	28,799 (53.4)	11,453 (21.2)	490 (0.9)	47 (0.1)	53,902 (100.0)		53,902	3.67	0.37
9.0～ (%)	9 (0.0)	102 (0.2)	700 (1.1)	3,450 (5.3)	16,318 (25.0)	32,185 (49.3)	11,719 (18.0)	722 (1.1)	31 (0.0)	65,236 (100.0)		65,236	3.60	0.42
9.5～ (%)	37 (0.1)	197 (0.5)	859 (2.0)	3,171 (7.5)	11,455 (27.0)	19,398 (45.7)	6,765 (16.0)	507 (1.2)	15 (0.0)	42,404 (100.0)		42,404	3.54	0.47
10.0～ (%)	7 (0.1)	40 (0.8)	128 (2.4)	464 (8.9)	1,488 (28.5)	2,284 (43.7)	734 (14.0)	78 (1.5)	4 (0.1)	5,227 (100.0)		5,227	3.50	0.49
10.1～ (%)	30 (0.2)	158 (1.2)	452 (3.4)	1,295 (9.8)	3,917 (29.5)	5,547 (41.8)	1,714 (12.9)	150 (1.1)	14 (0.1)	13,277 (100.0)		13,277	3.45	0.53
10.5～ (%)	15 (0.2)	93 (1.4)	302 (4.7)	819 (12.7)	2,012 (31.2)	2,452 (38.0)	679 (10.5)	71 (1.1)	10 (0.2)	6,453 (100.0)		6,453	3.38	0.55
11.0～ (%)	14 (0.6)	45 (2.1)	182 (8.4)	393 (18.2)	689 (31.8)	646 (29.8)	177 (8.2)	16 (0.7)	3 (0.1)	2,165 (100.0)		2,165	3.22	0.60
11.5～ (%)	9 (1.2)	30 (3.9)	90 (11.7)	164 (21.3)	212 (27.6)	205 (26.7)	51 (6.6)	7 (0.9)	1 (0.1)	769 (100.0)		769	3.11	0.66
12.0～ (%)	16 (3.0)	36 (6.7)	78 (14.5)	123 (22.8)	152 (28.2)	96 (17.8)	35 (6.5)	3 (0.6)		539 (100.0)		539	2.94	0.71
合計 (%)	143 (0.1)	750 (0.3)	3,129 (1.4)	12,072 (5.5)	51,955 (23.8)	107,021 (49.1)	40,447 (18.5)	2,360 (1.1)	172 (0.1)	218,049 (100.0)		218,049	3.60	0.44
記載なし (%)	3 (0.7)	21 (4.6)	50 (11.0)	78 (17.2)	127 (28.0)	114 (25.1)	59 (13.0)	2 (0.4)		454 (100.0)	10,468	10,922	3.19	0.68
総計 (%)	146 (0.1)	771 (0.4)	3,179 (1.5)	12,150 (5.6)	52,082 (23.8)	107,135 (49.0)	40,506 (18.5)	2,362 (1.1)	172 (0.1)	218,503 (100.0)	10,468	228,971	3.60	0.44
平均	10.46	10.12	9.86	9.58	9.31	9.11	9.03	9.21	8.96	9.18		9.18		
標準偏差	1.09	0.92	0.91	0.80	0.72	0.70	0.71	0.73	1.02	0.74		0.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査