

表 3255 透析前アルブミン濃度(g/dL) 総コレステロール濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

総コレステロール濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)	35 (0.5)	155 (2.4)	424 (6.6)	941 (14.7)	1,930 (30.2)	2,278 (35.6)	592 (9.3)	36 (0.6)	4 (0.1)	6,395 (100.0)	59	6,454	3.29	0.59
100～ (%)	16 (0.1)	125 (0.7)	487 (2.6)	1,634 (8.9)	5,473 (29.7)	8,144 (44.1)	2,428 (13.2)	125 (0.7)	18 (0.1)	18,450 (100.0)	170	18,620	3.48	0.48
120～ (%)	12 (0.0)	96 (0.3)	479 (1.4)	2,154 (6.3)	9,067 (26.7)	16,488 (48.5)	5,429 (16.0)	273 (0.8)	19 (0.1)	34,017 (100.0)	298	34,315	3.56	0.43
140～ (%)	17 (0.0)	64 (0.2)	372 (1.0)	1,755 (4.6)	9,177 (23.9)	19,338 (50.3)	7,337 (19.1)	387 (1.0)	30 (0.1)	38,477 (100.0)	349	38,826	3.62	0.41
160～ (%)	3 (0.0)	25 (0.1)	215 (0.7)	1,179 (3.8)	6,678 (21.3)	16,278 (52.0)	6,504 (20.8)	400 (1.3)	23 (0.1)	31,305 (100.0)	278	31,583	3.66	0.40
180～ (%)	4 (0.0)	26 (0.1)	92 (0.5)	702 (3.6)	3,880 (20.0)	9,971 (51.3)	4,451 (22.9)	292 (1.5)	17 (0.1)	19,435 (100.0)	184	19,619	3.69	0.40
200～ (%)	2 (0.0)	8 (0.1)	52 (0.5)	312 (3.1)	1,841 (18.2)	5,247 (51.9)	2,472 (24.4)	166 (1.6)	13 (0.1)	10,113 (100.0)	96	10,209	3.71	0.39
220～ (%)	3 (0.1)	6 (0.1)	37 (0.8)	172 (3.9)	796 (18.0)	2,210 (49.9)	1,130 (25.5)	78 (1.8)	1 (0.0)	4,433 (100.0)	42	4,475	3.70	0.42
240～ (%)	2 (0.1)	8 (0.5)	12 (0.7)	61 (3.6)	360 (21.0)	827 (48.3)	402 (23.5)	36 (2.1)	3 (0.2)	1,711 (100.0)	22	1,733	3.67	0.44
260～ (%)	6 (0.5)	6 (0.5)	29 (2.6)	61 (5.5)	230 (20.9)	512 (46.5)	238 (21.6)	18 (1.6)	1 (0.1)	1,101 (100.0)	10	1,111	3.61	0.52
合計 (%)	100 (0.1)	519 (0.3)	2,199 (1.3)	8,971 (5.4)	39,432 (23.8)	81,293 (49.1)	30,983 (18.7)	1,811 (1.1)	129 (0.1)	165,437 (100.0)	1,508	166,945	3.60	0.44
記載なし (%)	46 (0.1)	252 (0.5)	980 (1.8)	3,179 (6.0)	12,650 (23.8)	25,842 (48.7)	9,523 (17.9)	551 (1.0)	43 (0.1)	53,066 (100.0)	8,960	62,026	3.58	0.46
総計 (%)	146 (0.1)	771 (0.4)	3,179 (1.5)	12,150 (5.6)	52,082 (23.8)	107,135 (49.0)	40,506 (18.5)	2,362 (1.1)	172 (0.1)	218,503 (100.0)	10,468	228,971	3.60	0.44
平均	130.47	122.92	132.66	141.74	149.75	156.50	161.62	165.43	157.88	154.71	155.55	154.71		
標準偏差	63.93	45.55	40.76	36.93	34.67	34.27	34.57	36.01	37.07	35.27	36.15	35.28		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査