

表 3256 透析前アルブミン濃度(g/dL) HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

| HDL-C濃度     | 1.5未満        | 1.5～         | 2.0～           | 2.5～            | 3.0～             | 3.5～              | 4.0～             | 4.5～           | 5.0～         | 合計                 | 記載なし   | 総計      | 平均   | 標準偏差 |
|-------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|--------|---------|------|------|
| 20未満<br>(%) | 26<br>(3.9)  | 80<br>(12.0) | 90<br>(13.5)   | 112<br>(16.8)   | 145<br>(21.7)    | 166<br>(24.9)     | 47<br>(7.0)      | 2<br>(0.3)     |              | 668<br>(100.0)     | 3      | 671     | 2.92 | 0.79 |
| 20～<br>(%)  | 17<br>(0.1)  | 135<br>(1.1) | 415<br>(3.3)   | 1,115<br>(8.8)  | 3,396<br>(26.7)  | 5,726<br>(45.0)   | 1,842<br>(14.5)  | 83<br>(0.7)    | 6<br>(0.0)   | 12,735<br>(100.0)  | 111    | 12,846  | 3.49 | 0.51 |
| 30～<br>(%)  | 7<br>(0.0)   | 94<br>(0.3)  | 622<br>(1.7)   | 2,426<br>(6.6)  | 9,627<br>(26.3)  | 17,427<br>(47.7)  | 6,017<br>(16.5)  | 312<br>(0.9)   | 32<br>(0.1)  | 36,564<br>(100.0)  | 324    | 36,888  | 3.56 | 0.44 |
| 40～<br>(%)  | 17<br>(0.0)  | 69<br>(0.2)  | 398<br>(1.0)   | 2,094<br>(5.2)  | 10,100<br>(25.0) | 20,170<br>(50.0)  | 7,121<br>(17.6)  | 354<br>(0.9)   | 36<br>(0.1)  | 40,359<br>(100.0)  | 370    | 40,729  | 3.60 | 0.42 |
| 50～<br>(%)  | 6<br>(0.0)   | 37<br>(0.1)  | 167<br>(0.6)   | 1,206<br>(4.2)  | 6,519<br>(22.6)  | 14,862<br>(51.6)  | 5,681<br>(19.7)  | 314<br>(1.1)   | 18<br>(0.1)  | 28,810<br>(100.0)  | 270    | 29,080  | 3.64 | 0.40 |
| 60～<br>(%)  | 4<br>(0.0)   | 26<br>(0.2)  | 91<br>(0.5)    | 535<br>(3.2)    | 3,410<br>(20.5)  | 8,581<br>(51.6)   | 3,739<br>(22.5)  | 239<br>(1.4)   | 14<br>(0.1)  | 16,639<br>(100.0)  | 153    | 16,792  | 3.68 | 0.40 |
| 70～<br>(%)  | 6<br>(0.1)   | 5<br>(0.1)   | 34<br>(0.4)    | 236<br>(2.9)    | 1,449<br>(17.8)  | 4,138<br>(50.9)   | 2,080<br>(25.6)  | 166<br>(2.0)   | 8<br>(0.1)   | 8,122<br>(100.0)   | 79     | 8,201   | 3.72 | 0.40 |
| 80～<br>(%)  | 3<br>(0.1)   | 3<br>(0.1)   | 23<br>(0.6)    | 92<br>(2.4)     | 639<br>(16.8)    | 1,916<br>(50.3)   | 1,044<br>(27.4)  | 85<br>(2.2)    | 4<br>(0.1)   | 3,809<br>(100.0)   | 25     | 3,834   | 3.74 | 0.40 |
| 90～<br>(%)  |              | 1<br>(0.1)   | 6<br>(0.3)     | 54<br>(3.1)     | 282<br>(16.4)    | 831<br>(48.4)     | 496<br>(28.9)    | 46<br>(2.7)    | 2<br>(0.1)   | 1,718<br>(100.0)   | 15     | 1,733   | 3.75 | 0.40 |
| 100～<br>(%) |              | 4<br>(0.3)   | 8<br>(0.6)     | 56<br>(3.9)     | 255<br>(17.6)    | 672<br>(46.3)     | 415<br>(28.6)    | 40<br>(2.8)    | 1<br>(0.1)   | 1,451<br>(100.0)   | 7      | 1,458   | 3.73 | 0.43 |
| 合計<br>(%)   | 86<br>(0.1)  | 454<br>(0.3) | 1,854<br>(1.2) | 7,926<br>(5.3)  | 35,822<br>(23.7) | 74,489<br>(49.4)  | 28,482<br>(18.9) | 1,641<br>(1.1) | 121<br>(0.1) | 150,875<br>(100.0) | 1,357  | 152,232 | 3.61 | 0.43 |
| 記載なし<br>(%) | 60<br>(0.1)  | 317<br>(0.5) | 1,325<br>(2.0) | 4,224<br>(6.2)  | 16,260<br>(24.0) | 32,646<br>(48.3)  | 12,024<br>(17.8) | 721<br>(1.1)   | 51<br>(0.1)  | 67,628<br>(100.0)  | 9,111  | 76,739  | 3.58 | 0.46 |
| 総計<br>(%)   | 146<br>(0.1) | 771<br>(0.4) | 3,179<br>(1.5) | 12,150<br>(5.6) | 52,082<br>(23.8) | 107,135<br>(49.0) | 40,506<br>(18.5) | 2,362<br>(1.1) | 172<br>(0.1) | 218,503<br>(100.0) | 10,468 | 228,971 | 3.60 | 0.44 |
| 平均          | 35.84        | 34.29        | 38.52          | 43.27           | 46.34            | 48.77             | 51.22            | 54.64          | 49.52        | 48.26              | 48.07  | 48.25   |      |      |
| 標準偏差        | 20.91        | 17.33        | 14.82          | 15.52           | 15.39            | 16.30             | 17.75            | 19.43          | 16.29        | 16.55              | 15.37  | 16.54   |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査