

表 3259 透析前アルブミン濃度(g/dL) 透析前拡張期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	1 (1.5)			5 (7.7)	17 (26.2)	30 (46.2)	12 (18.5)			65 (100.0)	2	67	3.56	0.48
20～ (%)	4 (0.7)	11 (1.8)	24 (4.0)	93 (15.6)	203 (34.0)	222 (37.2)	38 (6.4)	2 (0.3)		597 (100.0)	15	612	3.30	0.54
40～ (%)	29 (0.2)	152 (1.0)	471 (2.9)	1,745 (10.9)	5,300 (33.1)	6,744 (42.2)	1,500 (9.4)	54 (0.3)	5 (0.0)	16,000 (100.0)	357	16,357	3.41	0.48
60～ (%)	54 (0.1)	331 (0.4)	1,440 (1.6)	5,414 (6.2)	23,142 (26.4)	43,229 (49.2)	13,469 (15.3)	656 (0.7)	67 (0.1)	87,802 (100.0)	1,823	89,625	3.56	0.44
80～ (%)	16 (0.0)	101 (0.2)	448 (1.0)	1,976 (4.3)	9,802 (21.3)	23,137 (50.4)	9,861 (21.5)	573 (1.2)	37 (0.1)	45,951 (100.0)	889	46,840	3.65	0.42
90～ (%)	14 (0.1)	55 (0.2)	238 (1.0)	869 (3.5)	4,531 (18.5)	12,310 (50.2)	6,063 (24.7)	416 (1.7)	15 (0.1)	24,511 (100.0)	437	24,948	3.69	0.42
100～ (%)	5 (0.0)	14 (0.1)	93 (0.8)	405 (3.4)	1,850 (15.5)	5,835 (48.9)	3,449 (28.9)	278 (2.3)	11 (0.1)	11,940 (100.0)	202	12,142	3.74	0.42
120～ (%)		2 (0.3)	3 (0.4)	20 (2.7)	98 (13.4)	350 (47.7)	242 (33.0)	18 (2.5)		733 (100.0)	8	741	3.78	0.40
140～ (%)			1 (1.9)		9 (17.0)	30 (56.6)	11 (20.8)	2 (3.8)		53 (100.0)	4	57	3.71	0.39
合計 (%)	123 (0.1)	666 (0.4)	2,718 (1.4)	10,527 (5.6)	44,952 (24.0)	91,887 (49.0)	34,645 (18.5)	1,999 (1.1)	135 (0.1)	187,652 (100.0)	3,737	191,389	3.60	0.44
記載なし (%)	23 (0.1)	105 (0.3)	461 (1.5)	1,623 (5.3)	7,130 (23.1)	15,248 (49.4)	5,861 (19.0)	363 (1.2)	37 (0.1)	30,851 (100.0)	6,731	37,582	3.61	0.45
総計 (%)	146 (0.1)	771 (0.4)	3,179 (1.5)	12,150 (5.6)	52,082 (23.8)	107,135 (49.0)	40,506 (18.5)	2,362 (1.1)	172 (0.1)	218,503 (100.0)	10,468	228,971	3.60	0.44
平均	70.06	69.56	72.00	72.51	74.77	78.08	81.68	84.35	78.56	77.58	76.30	77.56		
標準偏差	17.69	15.55	14.62	14.69	14.05	14.01	14.19	14.18	13.10	14.38	14.60	14.39		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査