

表 3260 透析前アルブミン濃度(g/dL) 透析前脈拍(拍/分)別(施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前脈拍	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)		1 (0.7)	4 (2.6)	10 (6.5)	47 (30.7)	66 (43.1)	23 (15.0)	1 (0.7)	1 (0.7)	153 (100.0)	2	155	3.50	0.48
40～ (%)	1 (0.1)	3 (0.2)	29 (1.5)	135 (7.1)	669 (35.4)	842 (44.6)	203 (10.7)	8 (0.4)		1,890 (100.0)	39	1,929	3.48	0.41
50～ (%)	8 (0.1)	39 (0.3)	216 (1.4)	951 (6.1)	4,484 (29.0)	7,658 (49.5)	2,026 (13.1)	74 (0.5)	12 (0.1)	15,468 (100.0)	305	15,773	3.54	0.42
60～ (%)	13 (0.0)	128 (0.3)	620 (1.3)	2,833 (5.9)	12,313 (25.7)	23,903 (50.0)	7,599 (15.9)	408 (0.9)	31 (0.1)	47,848 (100.0)	893	48,741	3.58	0.42
70～ (%)	33 (0.1)	172 (0.3)	737 (1.3)	3,104 (5.4)	13,523 (23.7)	28,123 (49.3)	10,742 (18.8)	599 (1.0)	36 (0.1)	57,069 (100.0)	1,115	58,184	3.61	0.44
80～ (%)	24 (0.1)	171 (0.5)	569 (1.6)	1,949 (5.4)	7,790 (21.6)	17,465 (48.5)	7,543 (20.9)	477 (1.3)	34 (0.1)	36,022 (100.0)	701	36,723	3.62	0.46
90～ (%)	21 (0.1)	77 (0.5)	260 (1.7)	827 (5.3)	3,259 (20.8)	7,384 (47.2)	3,569 (22.8)	234 (1.5)	13 (0.1)	15,644 (100.0)	274	15,918	3.64	0.47
100～ (%)	14 (0.3)	35 (0.7)	119 (2.5)	270 (5.6)	1,003 (20.9)	2,176 (45.3)	1,103 (22.9)	80 (1.7)	7 (0.1)	4,807 (100.0)	97	4,904	3.62	0.51
110～ (%)	5 (0.4)	10 (0.9)	48 (4.2)	82 (7.2)	258 (22.7)	465 (40.9)	245 (21.5)	24 (2.1)		1,137 (100.0)	20	1,157	3.55	0.57
120～ (%)		11 (2.2)	9 (1.8)	37 (7.6)	112 (22.9)	218 (44.5)	91 (18.6)	12 (2.4)		490 (100.0)	8	498	3.54	0.54
合計 (%)	119 (0.1)	647 (0.4)	2,611 (1.4)	10,198 (5.6)	43,458 (24.1)	88,300 (48.9)	33,144 (18.4)	1,917 (1.1)	134 (0.1)	180,528 (100.0)	3,454	183,982	3.60	0.44
記載なし (%)	27 (0.1)	124 (0.3)	568 (1.5)	1,952 (5.1)	8,624 (22.7)	18,835 (49.6)	7,362 (19.4)	445 (1.2)	38 (0.1)	37,975 (100.0)	7,014	44,989	3.61	0.44
総計 (%)	146 (0.1)	771 (0.4)	3,179 (1.5)	12,150 (5.6)	52,082 (23.8)	107,135 (49.0)	40,506 (18.5)	2,362 (1.1)	172 (0.1)	218,503 (100.0)	10,468	228,971	3.60	0.44
平均	82.00	79.08	76.26	74.03	73.25	74.26	76.43	78.29	76.24	74.50	74.39	74.50		
標準偏差	15.08	14.77	14.16	13.31	12.81	12.61	12.64	13.53	12.97	12.80	12.68	12.80		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査