

表 3261 透析前アルブミン濃度(g/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 （％）	5 (0.0)	45 (0.2)	177 (0.7)	830 (3.4)	5,210 (21.4)	12,926 (53.1)	4,913 (20.2)	240 (1.0)	14 (0.1)	24,360 (100.0)	834	25,194	3.66	0.39
女性 （％）	5 (0.0)	17 (0.1)	117 (0.8)	562 (3.9)	3,597 (25.2)	7,659 (53.6)	2,245 (15.7)	77 (0.5)	4 (0.0)	14,283 (100.0)	469	14,752	3.60	0.38
合計 （％）	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,392 (3.6)	8,807 (22.8)	20,585 (53.3)	7,158 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,643 (100.0)	1,303	39,946	3.64	0.39
記載なし （％）														
総計 （％）	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,392 (3.6)	8,807 (22.8)	20,585 (53.3)	7,158 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,643 (100.0)	1,303	39,946	3.64	0.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査