

表 3263 透析前アルブミン濃度(g/dL) 透析歴(年)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)		19 (0.4)	55 (1.2)	200 (4.2)	1,091 (22.8)	2,499 (52.3)	873 (18.3)	42 (0.9)	3 (0.1)	4,782 (100.0)	182	4,964	3.62	0.42
2年～ (%)	4 (0.0)	11 (0.1)	64 (0.8)	297 (3.6)	1,834 (21.9)	4,383 (52.4)	1,670 (20.0)	97 (1.2)	2 (0.0)	8,362 (100.0)	253	8,615	3.65	0.39
5年～ (%)	2 (0.0)	14 (0.1)	85 (0.9)	357 (3.6)	2,227 (22.8)	5,201 (53.2)	1,809 (18.5)	85 (0.9)	3 (0.0)	9,783 (100.0)	333	10,116	3.63	0.39
10年～ (%)	1 (0.0)	9 (0.2)	37 (0.6)	196 (3.3)	1,298 (21.6)	3,276 (54.6)	1,137 (19.0)	40 (0.7)	3 (0.1)	5,997 (100.0)	197	6,194	3.65	0.38
15年～ (%)		1 (0.0)	22 (0.6)	126 (3.3)	861 (22.7)	2,076 (54.7)	686 (18.1)	21 (0.6)	3 (0.1)	3,796 (100.0)	128	3,924	3.64	0.37
20年～ (%)		3 (0.1)	9 (0.4)	69 (2.7)	551 (21.7)	1,393 (54.7)	498 (19.6)	18 (0.7)	4 (0.2)	2,545 (100.0)	92	2,637	3.66	0.36
25年～ (%)	1 (0.1)	4 (0.2)	8 (0.5)	48 (3.0)	392 (24.4)	861 (53.7)	282 (17.6)	8 (0.5)		1,604 (100.0)	47	1,651	3.63	0.37
30年～ (%)	2 (0.2)		7 (0.7)	47 (4.4)	314 (29.2)	565 (52.5)	138 (12.8)	3 (0.3)		1,076 (100.0)	47	1,123	3.56	0.38
35年～ (%)			6 (1.1)	41 (7.2)	186 (32.6)	281 (49.3)	54 (9.5)	2 (0.4)		570 (100.0)	17	587	3.49	0.39
40年～ (%)		1 (0.8)	1 (0.8)	11 (9.2)	51 (42.9)	45 (37.8)	9 (7.6)	1 (0.8)		119 (100.0)	5	124	3.40	0.43
合計 (%)	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,392 (3.6)	8,805 (22.8)	20,580 (53.3)	7,156 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,634 (100.0)	1,301	39,935	3.64	0.39
不明 (%)					2 (22.2)	5 (55.6)	2 (22.2)			9 (100.0)	2	11	3.69	0.42
記載なし (%)														
総計 (%)	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,392 (3.6)	8,807 (22.8)	20,585 (53.3)	7,158 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,643 (100.0)	1,303	39,946	3.64	0.39
平均	12.80	7.50	8.42	10.09	10.50	10.05	9.47	8.04	11.28	10.02	10.20	10.02		
標準偏差	12.27	8.91	8.57	9.75	9.45	8.75	8.24	7.60	8.54	8.86	9.09	8.87		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査