

表 3264 透析前アルブミン濃度(g/dL) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	6 (0.0)	12 (0.1)	78 (0.5)	466 (3.2)	3,237 (22.1)	7,844 (53.6)	2,846 (19.5)	130 (0.9)	8 (0.1)	14,627 (100.0)	449	15,076	3.65	0.38
慢性腎盂腎炎 （％）			1 (0.2)	11 (2.7)	77 (18.9)	235 (57.7)	79 (19.4)	3 (0.7)	1 (0.2)	407 (100.0)	15	422	3.68	0.35
急速進行性糸球 体腎炎 （％）		1 (0.4)	1 (0.4)	16 (5.8)	70 (25.3)	138 (49.8)	47 (17.0)	4 (1.4)		277 (100.0)	7	284	3.60	0.42
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）				10 (2.8)	80 (22.7)	208 (58.9)	52 (14.7)	3 (0.8)		353 (100.0)	6	359	3.63	0.32
その他の分類不 能の腎炎 （％）			1 (0.5)	5 (2.7)	31 (16.5)	99 (52.7)	47 (25.0)	4 (2.1)	1 (0.5)	188 (100.0)	7	195	3.73	0.39
多発性嚢胞腎 （％）		1 (0.1)	7 (0.5)	52 (3.7)	335 (23.8)	785 (55.7)	220 (15.6)	9 (0.6)		1,409 (100.0)	55	1,464	3.62	0.37
腎硬化症 （％）		4 (0.1)	18 (0.6)	113 (4.0)	767 (27.3)	1,419 (50.4)	466 (16.6)	26 (0.9)	1 (0.0)	2,814 (100.0)	72	2,886	3.61	0.39
悪性高血圧 （％）				9 (3.0)	49 (16.3)	170 (56.7)	68 (22.7)	4 (1.3)		300 (100.0)	12	312	3.72	0.35
糖尿病性腎症 （％）	3 (0.0)	33 (0.3)	142 (1.1)	501 (3.9)	2,914 (22.8)	6,750 (52.9)	2,323 (18.2)	90 (0.7)	1 (0.0)	12,757 (100.0)	416	13,173	3.62	0.40
SLE腎炎 （％）			2 (0.6)	10 (2.8)	101 (28.7)	179 (50.9)	60 (17.0)			352 (100.0)	11	363	3.60	0.37
アミロイド腎 （％）		1 (1.7)	2 (3.4)	6 (10.3)	13 (22.4)	25 (43.1)	11 (19.0)			58 (100.0)	1	59	3.49	0.56
痛風腎 （％）			1 (0.7)	2 (1.4)	39 (26.7)	81 (55.5)	22 (15.1)	1 (0.7)		146 (100.0)	8	154	3.63	0.35
先天性代謝異常 による腎不全 （％）				1 (2.4)	6 (14.6)	18 (43.9)	15 (36.6)	1 (2.4)		41 (100.0)	3	44	3.83	0.39
腎・尿路結核 （％）					5 (25.0)	12 (60.0)	3 (15.0)			20 (100.0)	2	22	3.65	0.27
腎・尿路結石 （％）				5 (7.5)	16 (23.9)	31 (46.3)	14 (20.9)	1 (1.5)		67 (100.0)	2	69	3.61	0.43
腎・尿路腫瘍 （％）				1 (1.2)	23 (27.7)	50 (60.2)	9 (10.8)			83 (100.0)	2	85	3.63	0.31
閉塞性尿路障害 （％）			1 (1.4)	2 (2.8)	14 (19.7)	41 (57.7)	12 (16.9)	1 (1.4)		71 (100.0)	3	74	3.68	0.37
骨髄腫 （％）				1 (5.3)	9 (47.4)	7 (36.8)	2 (10.5)			19 (100.0)		19	3.45	0.42
腎形成不全 （％）		1 (1.0)			16 (16.5)	43 (44.3)	35 (36.1)	2 (2.1)		97 (100.0)	4	101	3.83	0.40
不明 （％）	1 (0.0)	4 (0.1)	30 (0.9)	123 (3.7)	734 (22.1)	1,802 (54.3)	590 (17.8)	27 (0.8)	6 (0.2)	3,317 (100.0)	163	3,480	3.64	0.39
再導入 （％）				13 (3.2)	78 (19.3)	231 (57.0)	81 (20.0)	2 (0.5)		405 (100.0)	11	416	3.68	0.35
その他 （％）		5 (0.6)	10 (1.2)	45 (5.4)	193 (23.1)	417 (49.9)	156 (18.7)	9 (1.1)		835 (100.0)	54	889	3.61	0.44
合計 （％）	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,392 (3.6)	8,807 (22.8)	20,585 (53.3)	7,158 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,643 (100.0)	1,303	39,946	3.64	0.39
記載なし （％）														
総計 （％）	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,392 (3.6)	8,807 (22.8)	20,585 (53.3)	7,158 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,643 (100.0)	1,303	39,946	3.64	0.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査