

表 3268 透析前アルブミン濃度(g/dL) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前補正 カルシウム濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)			1 (0.6)	5 (3.1)	24 (15.0)	94 (58.8)	36 (22.5)			160 (100.0)		160	3.71	0.34
7.0～ (%)				7 (2.7)	36 (13.9)	151 (58.3)	64 (24.7)	1 (0.4)		259 (100.0)		259	3.73	0.32
7.5～ (%)				14 (1.5)	124 (13.0)	552 (58.0)	255 (26.8)	6 (0.6)		951 (100.0)		951	3.77	0.31
8.0～ (%)			4 (0.1)	40 (1.4)	384 (13.4)	1,777 (62.0)	641 (22.4)	19 (0.7)	3 (0.1)	2,868 (100.0)		2,868	3.74	0.31
8.4～ (%)			1 (0.1)	12 (1.5)	142 (17.4)	373 (45.6)	279 (34.1)	8 (1.0)	3 (0.4)	818 (100.0)		818	3.76	0.36
8.5～ (%)		2 (0.0)	23 (0.2)	168 (1.8)	1,779 (19.1)	5,312 (57.1)	1,941 (20.9)	75 (0.8)	1 (0.0)	9,301 (100.0)		9,301	3.70	0.34
9.0～ (%)		14 (0.1)	45 (0.4)	352 (3.1)	2,668 (23.2)	6,189 (53.7)	2,136 (18.5)	106 (0.9)	5 (0.0)	11,515 (100.0)		11,515	3.65	0.37
9.5～ (%)	1 (0.0)	13 (0.2)	78 (1.0)	360 (4.7)	2,030 (26.7)	3,868 (50.8)	1,194 (15.7)	67 (0.9)	1 (0.0)	7,612 (100.0)		7,612	3.59	0.40
10.0～ (%)	1 (0.1)	3 (0.3)	20 (2.2)	55 (6.1)	267 (29.6)	422 (46.7)	126 (14.0)	7 (0.8)	2 (0.2)	903 (100.0)		903	3.53	0.44
10.1～ (%)	1 (0.0)	7 (0.3)	53 (2.2)	183 (7.5)	737 (30.1)	1,149 (46.9)	304 (12.4)	17 (0.7)	1 (0.0)	2,452 (100.0)		2,452	3.51	0.44
10.5～ (%)	1 (0.1)	9 (0.8)	36 (3.1)	107 (9.1)	421 (36.0)	464 (39.7)	122 (10.4)	9 (0.8)	1 (0.1)	1,170 (100.0)		1,170	3.43	0.48
11.0～ (%)	3 (0.8)	4 (1.0)	12 (3.1)	55 (14.4)	127 (33.2)	146 (38.1)	33 (8.6)	2 (0.5)	1 (0.3)	383 (100.0)		383	3.35	0.53
11.5～ (%)		7 (5.3)	13 (9.8)	18 (13.6)	36 (27.3)	48 (36.4)	10 (7.6)			132 (100.0)		132	3.21	0.60
12.0～ (%)	3 (4.2)	3 (4.2)	4 (5.6)	13 (18.3)	25 (35.2)	19 (26.8)	4 (5.6)			71 (100.0)		71	3.08	0.68
合計 (%)	10 (0.0)	62 (0.2)	290 (0.8)	1,389 (3.6)	8,800 (22.8)	20,564 (53.3)	7,145 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,595 (100.0)		38,595	3.64	0.39
記載なし (%)			4 (8.3)	3 (6.3)	7 (14.6)	21 (43.8)	13 (27.1)			48 (100.0)	1,303	1,351	3.58	0.56
総計 (%)	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,392 (3.6)	8,807 (22.8)	20,585 (53.3)	7,158 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,643 (100.0)	1,303	39,946	3.64	0.39
平均	11.26	10.26	9.95	9.63	9.35	9.13	9.03	9.20	9.17	9.19		9.19		
標準偏差	1.10	1.06	0.85	0.86	0.75	0.72	0.70	0.62	0.90	0.75		0.75		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査