

表 3271 透析前アルブミン濃度(g/dL) PTH値(pg/mL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回) PTH測定法:whole-PTH

PTH値	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		1 (0.4)		12 (5.0)	66 (27.4)	120 (49.8)	37 (15.4)	5 (2.1)		241 (100.0)	8	249	3.60	0.41
20～ (%)			4 (1.3)	11 (3.7)	74 (24.9)	163 (54.9)	45 (15.2)			297 (100.0)	4	301	3.61	0.38
35～ (%)			2 (0.7)	8 (3.0)	61 (22.7)	151 (56.1)	47 (17.5)			269 (100.0)	5	274	3.64	0.36
50～ (%)			4 (0.9)	13 (3.0)	131 (30.0)	218 (49.9)	66 (15.1)	5 (1.1)		437 (100.0)	7	444	3.60	0.38
75～ (%)			2 (0.5)	8 (2.1)	92 (24.1)	206 (53.9)	71 (18.6)	3 (0.8)		382 (100.0)	9	391	3.65	0.36
100～ (%)				10 (3.1)	72 (22.2)	196 (60.3)	44 (13.5)	3 (0.9)		325 (100.0)	6	331	3.64	0.32
125～ (%)			2 (0.9)	4 (1.8)	52 (22.8)	130 (57.0)	36 (15.8)	4 (1.8)		228 (100.0)	6	234	3.65	0.36
150～ (%)					1 (25.0)	3 (75.0)				4 (100.0)		4	3.67	0.19
151～ (%)		1 (0.5)	1 (0.5)	6 (2.8)	44 (20.9)	123 (58.3)	36 (17.1)			211 (100.0)	4	215	3.62	0.38
180～ (%)				4 (3.0)	29 (21.6)	77 (57.5)	24 (17.9)			134 (100.0)	3	137	3.67	0.33
210～ (%)				3 (3.2)	19 (20.2)	53 (56.4)	18 (19.1)	1 (1.1)		94 (100.0)	4	98	3.66	0.36
240～ (%)			1 (1.1)	6 (6.9)	24 (27.6)	51 (58.6)	5 (5.7)			87 (100.0)	1	88	3.52	0.34
300～ (%)					13 (31.0)	19 (45.2)	10 (23.8)			42 (100.0)		42	3.66	0.34
350～ (%)			1 (3.4)		6 (20.7)	16 (55.2)	5 (17.2)	1 (3.4)		29 (100.0)		29	3.65	0.39
400～ (%)					6 (25.0)	12 (50.0)	6 (25.0)			24 (100.0)		24	3.73	0.30
500～ (%)					12 (26.7)	24 (53.3)	9 (20.0)			45 (100.0)		45	3.68	0.29
合計 (%)		2 (0.1)	17 (0.6)	85 (3.0)	702 (24.6)	1,562 (54.8)	459 (16.1)	22 (0.8)		2,849 (100.0)	57	2,906	3.63	0.36
記載なし (%)			1 (9.1)	1 (9.1)	3 (27.3)	6 (54.5)				11 (100.0)	20	31	3.38	0.50
総計 (%)		2 (0.1)	18 (0.6)	86 (3.0)	705 (24.7)	1,568 (54.8)	459 (16.0)	22 (0.8)		2,860 (100.0)	77	2,937	3.63	0.37
平均		84.00	97.53	92.24	107.96	113.80	117.85	94.73		112.11	95.98	111.79		
標準偏差		104.65	91.70	72.93	100.41	106.27	133.68	80.71		108.76	67.42	108.12		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査