

表 3272 透析前アルブミン濃度(g/dL) 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前ヘモグロビン 濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5未満 (%)				3 (11.5)	3 (11.5)	12 (46.2)	8 (30.8)			26 (100.0)		26	3.65	0.46
5～ (%)		2 (6.7)	1 (3.3)	5 (16.7)	4 (13.3)	14 (46.7)	3 (10.0)	1 (3.3)		30 (100.0)	1	31	3.38	0.71
6～ (%)	1 (0.9)	5 (4.5)	19 (17.3)	17 (15.5)	26 (23.6)	38 (34.5)	3 (2.7)	1 (0.9)		110 (100.0)	4	114	3.08	0.65
7～ (%)	1 (0.2)	7 (1.6)	35 (7.9)	87 (19.7)	177 (40.1)	108 (24.5)	25 (5.7)	1 (0.2)		441 (100.0)	4	445	3.18	0.53
8～ (%)	1 (0.1)	15 (0.9)	57 (3.5)	199 (12.4)	516 (32.0)	658 (40.8)	159 (9.9)	5 (0.3)	1 (0.1)	1,611 (100.0)	26	1,637	3.40	0.49
9～ (%)	3 (0.1)	15 (0.3)	72 (1.2)	336 (5.8)	1,721 (29.8)	2,836 (49.1)	753 (13.0)	42 (0.7)	3 (0.1)	5,781 (100.0)	69	5,850	3.54	0.41
10～ (%)	2 (0.0)	11 (0.1)	64 (0.5)	395 (3.1)	2,848 (22.2)	7,041 (54.8)	2,373 (18.5)	108 (0.8)	9 (0.1)	12,851 (100.0)	96	12,947	3.65	0.37
11～ (%)	1 (0.0)	5 (0.0)	20 (0.2)	220 (1.9)	2,332 (20.3)	6,370 (55.4)	2,452 (21.3)	94 (0.8)	2 (0.0)	11,496 (100.0)	81	11,577	3.69	0.35
12～ (%)	1 (0.0)		14 (0.3)	82 (1.9)	812 (18.7)	2,443 (56.4)	932 (21.5)	49 (1.1)	1 (0.0)	4,334 (100.0)	48	4,382	3.70	0.35
13～ (%)			5 (0.4)	25 (2.1)	208 (17.7)	661 (56.1)	271 (23.0)	8 (0.7)		1,178 (100.0)	7	1,185	3.71	0.35
14～ (%)		1 (0.2)	1 (0.2)	9 (1.7)	86 (16.6)	278 (53.8)	133 (25.7)	8 (1.5)	1 (0.2)	517 (100.0)	6	523	3.74	0.36
合計 (%)	10 (0.0)	61 (0.2)	288 (0.8)	1,378 (3.6)	8,733 (22.8)	20,459 (53.3)	7,112 (18.5)	317 (0.8)	17 (0.0)	38,375 (100.0)	342	38,717	3.64	0.39
記載なし (%)		1 (0.4)	6 (2.2)	14 (5.2)	74 (27.6)	126 (47.0)	46 (17.2)		1 (0.4)	268 (100.0)	961	1,229	3.56	0.45
総計 (%)	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,392 (3.6)	8,807 (22.8)	20,585 (53.3)	7,158 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,643 (100.0)	1,303	39,946	3.64	0.39
平均	9.58	9.03	9.41	10.02	10.63	10.92	11.09	11.03	10.71	10.84	10.65	10.84		
標準偏差	1.58	1.74	1.58	1.47	1.28	1.20	1.19	1.24	1.39	1.26	1.46	1.26		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査