

表 3273 透析前アルブミン濃度(g/dL) 総コレステロール濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

総コレステロール濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)	3 (0.3)	23 (2.3)	56 (5.7)	126 (12.8)	292 (29.7)	391 (39.8)	87 (8.9)	4 (0.4)	1 (0.1)	983 (100.0)	9	992	3.34	0.57
100～ (%)		9 (0.3)	62 (2.1)	196 (6.6)	892 (30.0)	1,414 (47.6)	385 (13.0)	12 (0.4)	2 (0.1)	2,972 (100.0)	16	2,988	3.51	0.43
120～ (%)	1 (0.0)	6 (0.1)	52 (0.9)	248 (4.4)	1,513 (26.8)	2,907 (51.4)	890 (15.7)	38 (0.7)	1 (0.0)	5,656 (100.0)	38	5,694	3.59	0.39
140～ (%)	2 (0.0)	4 (0.1)	30 (0.4)	223 (3.2)	1,629 (23.7)	3,661 (53.3)	1,261 (18.3)	61 (0.9)	2 (0.0)	6,873 (100.0)	32	6,905	3.64	0.37
160～ (%)			11 (0.2)	152 (2.5)	1,235 (20.6)	3,263 (54.5)	1,272 (21.3)	48 (0.8)	2 (0.0)	5,983 (100.0)	28	6,011	3.69	0.35
180～ (%)			14 (0.4)	68 (1.8)	697 (18.1)	2,174 (56.5)	848 (22.0)	41 (1.1)	4 (0.1)	3,846 (100.0)	27	3,873	3.71	0.35
200～ (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	3 (0.1)	32 (1.4)	391 (17.5)	1,273 (56.9)	506 (22.6)	27 (1.2)	1 (0.0)	2,236 (100.0)	17	2,253	3.72	0.34
220～ (%)			2 (0.2)	9 (0.9)	185 (19.4)	494 (51.9)	246 (25.8)	15 (1.6)	1 (0.1)	952 (100.0)	4	956	3.74	0.35
240～ (%)			1 (0.3)	8 (2.1)	65 (17.0)	194 (50.7)	108 (28.2)	6 (1.6)	1 (0.3)	383 (100.0)	1	384	3.76	0.37
260～ (%)		1 (0.5)	1 (0.5)	4 (1.9)	48 (22.5)	105 (49.3)	48 (22.5)	6 (2.8)		213 (100.0)	3	216	3.68	0.42
合計 (%)	7 (0.0)	45 (0.1)	232 (0.8)	1,066 (3.5)	6,947 (23.1)	15,876 (52.7)	5,651 (18.8)	258 (0.9)	15 (0.0)	30,097 (100.0)	175	30,272	3.64	0.39
記載なし (%)	3 (0.0)	17 (0.2)	62 (0.7)	326 (3.8)	1,860 (21.8)	4,709 (55.1)	1,507 (17.6)	59 (0.7)	3 (0.0)	8,546 (100.0)	1,128	9,674	3.63	0.38
総計 (%)	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,392 (3.6)	8,807 (22.8)	20,585 (53.3)	7,158 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,643 (100.0)	1,303	39,946	3.64	0.39
平均	131.57	107.71	123.63	139.07	152.29	159.69	165.14	170.15	168.73	158.00	158.04	158.00		
標準偏差	47.97	45.52	35.98	35.23	35.39	34.73	35.10	38.70	47.03	35.69	37.45	35.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査