

表 3274 透析前アルブミン濃度(g/dL) HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

HDL-C濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	1 (1.3)	10 (12.5)	12 (15.0)	9 (11.3)	17 (21.3)	22 (27.5)	9 (11.3)			80 (100.0)	1	81	3.01	0.82
20～ (%)		14 (0.8)	57 (3.1)	137 (7.4)	479 (25.8)	899 (48.4)	264 (14.2)	6 (0.3)		1,856 (100.0)	18	1,874	3.51	0.47
30～ (%)		11 (0.2)	61 (1.0)	312 (5.1)	1,548 (25.4)	3,145 (51.7)	966 (15.9)	43 (0.7)	3 (0.0)	6,089 (100.0)	42	6,131	3.59	0.40
40～ (%)	2 (0.0)	3 (0.0)	45 (0.6)	274 (3.7)	1,824 (25.0)	3,882 (53.1)	1,233 (16.9)	42 (0.6)	5 (0.1)	7,310 (100.0)	50	7,360	3.62	0.38
50～ (%)		2 (0.0)	20 (0.3)	146 (2.5)	1,355 (22.8)	3,275 (55.2)	1,084 (18.3)	46 (0.8)	2 (0.0)	5,930 (100.0)	41	5,971	3.66	0.35
60～ (%)			10 (0.3)	60 (1.6)	731 (19.1)	2,156 (56.2)	841 (21.9)	36 (0.9)	1 (0.0)	3,835 (100.0)	22	3,857	3.70	0.34
70～ (%)			1 (0.0)	29 (1.4)	335 (16.7)	1,122 (55.9)	494 (24.6)	25 (1.2)	1 (0.0)	2,007 (100.0)	16	2,023	3.74	0.33
80～ (%)			4 (0.4)	12 (1.2)	165 (16.4)	556 (55.4)	254 (25.3)	11 (1.1)	2 (0.2)	1,004 (100.0)	9	1,013	3.73	0.35
90～ (%)	1 (0.2)	1 (0.2)		8 (1.9)	72 (16.7)	227 (52.7)	116 (26.9)	5 (1.2)	1 (0.2)	431 (100.0)		431	3.74	0.38
100～ (%)		1 (0.3)	1 (0.3)	9 (2.4)	65 (17.0)	189 (49.5)	111 (29.1)	6 (1.6)		382 (100.0)	1	383	3.75	0.38
合計 (%)	4 (0.0)	42 (0.1)	211 (0.7)	996 (3.4)	6,591 (22.8)	15,473 (53.5)	5,372 (18.6)	220 (0.8)	15 (0.1)	28,924 (100.0)	200	29,124	3.64	0.38
記載なし (%)	6 (0.1)	20 (0.2)	83 (0.9)	396 (4.1)	2,216 (22.8)	5,112 (52.6)	1,786 (18.4)	97 (1.0)	3 (0.0)	9,719 (100.0)	1,103	10,822	3.63	0.40
総計 (%)	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,392 (3.6)	8,807 (22.8)	20,585 (53.3)	7,158 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,643 (100.0)	1,303	39,946	3.64	0.39
平均	48.25	32.05	37.60	43.14	48.57	51.41	53.98	55.85	55.60	50.86	49.66	50.85		
標準偏差	32.31	19.69	14.85	15.30	16.02	16.99	18.32	18.29	20.18	17.19	16.23	17.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査